

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Année 1914

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE

Par Madame DEJUST-DEFIOL

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE

DE LA

RÉACTION D'ABDERHALDEN

TECHNIQUE, RÉSULTATS CLINIQUES

EXPÉRIENCES PERSONNELLES

Président : M. CHARLES RICHET, professeur.

PARIS

VIGOT FRÈRES, ÉDITEURS

23, PLACE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE, 23

1914

N.
255

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE



Digitized by the Internet Archive
in 2026

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Année 1914

THÈSE

N.°

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE

Par Madame DEJUST-DEFIOL

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE

DE LA

RÉACTION D'ABDERHALDEN

TECHNIQUE, RÉSULTATS CLINIQUES

EXPÉRIENCES PERSONNELLES

Président : M. CHARLES RICHET, professeur.



PARIS

VIGOT FRERES, ÉDITEURS

23, PLACE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE. 23

1914

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Doyen.	M. LANDOUZY.
Professeurs	MM.
Anatomie	NICOLAS.
Physiologie	CH. RICHT.
Physique médicale	WEISS.
Chimie organique et chimie générale.	DESGREZ.
Parasitologie et Histoire naturelle médicale	BLANCHARD.
Pathologie et thérapeutique générales	ACHARD.
Pathologie médicale	WIDAL.
Pathologie chirurgicale.	TEISSIER.
Anatomie pathologique.	LEJARS.
Histologie.	PIERRE MARIE.
Opérations et appareils.	PRENANT.
Pharmacologie et matière médicale	AUG. BROCA.
Thérapeutique	POUCHET.
Hygiène	MARFAN.
Médecine légale.	CHANTEMESSE.
Histoire de la médecine et de la chirurgie.	THOINOT.
Pathologie expérimentale et comparée	LETULLE.
Clinique médicale	ROGER.
Maladies des enfants.	DEBOVE.
Clinique de pathologie mentale et des maladies de l'encéphale	LANDOUZY.
Clinique des maladies cutanées et syphilitiques	GILBERT.
Clinique des maladies du système nerveux.	CHAUFFARD.
Clinique chirurgicale.	HUTINEL.
Clinique ophtalmologique	GILBERT BALLET
Clinique des maladies des voies urinaires	GAUCHER.
Clinique d'accouchements.	DEJERINE.
Clinique gynécologique.	PIERRE DELBET.
Clinique chirurgicale infantile	QUENU.
Clinique thérapeutique	RECLUS.
	HARTMANN.
	DE LAPERSONNE.
	LEGUEU.
	BAR.
	PINARD.
	RIBEMONT-DES-SAIGNES.
	POZZI.
	KI MISSON.
	A. ROBIN.

Agréés en exercice.

MM.			
ALGLAVE	GUENIOT	LEREBOULLET	RIBIERRE
BERNARD	GUILLAIN	LERI	RICHAUD
BRANCA	JEANNIN	LOEPER	ROUSSY
BRUMPT	JOUSSET (ANDRÉ)	MAILLARD	ROUVIERE
CAMUS	LARBE HENRI	MOCQUOT	SAUVAGE
CASTAIGNE	LAINDEL-LAVAS	MULON	SCHWARTZ (A.)
CHAMPY	TINE	NICLOUX	SICARD
CHEVASSU	LANGLOIS	NOBECOURT	TANON
COUVELAIRE	LECÈNE	OKINCZYC	TERRIEN
DESMAREST	LEMIERRE	OMBREDANNE	TIFFENEAU
GOUGEROT	LENORMANT	RATHIERY	VILLARET
GREGOIRE	LEQUEUX	RETTERRER	ZIMMERN

Par délibération en date du 9 décembre 1798, l'École a arrêté que les opinions émises dans les dissertations qui lui seront présentées doivent être considérées comme propres à leurs auteurs et qu'elle n'entend leur donner aucune approbation ni improbation.

Je remercie très vivement M. G. Bertrand, Professeur de chimie biologique à la Faculté des Sciences, d'avoir bien voulu me donner une place dans son laboratoire. J'y ai étudié les sérums humains que M. le Professeur agrégé Sauvage m'a très obligeamment procurés, ainsi que les organes et les sérums d'animaux que M. Frouin a pris la peine, dont je le suis tout à fait sincèrement reconnaissante, de prélever à mon intention.

A MONSIEUR LE PROFESSEUR CHARLES RICHET

Qui a bien voulu me faire l'honneur de présider cette thèse.

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DE LA RÉACTION D'ABDERHALDEN

INTRODUCTION

Nous voulons seulement indiquer ici en quoi consiste notre modeste travail.

En France, actuellement, peu de chercheurs ont encore publié les résultats qu'ils ont obtenus au moyen de la séro-réaction d'Abderhalden. Certaines communications ne témoignent guère d'une connaissance suffisante des travaux effectués à l'étranger.

En Allemagne, au contraire, une énorme floraison d'expériences a vu le jour, mais elles sont éparses dans des revues médicales qu'il est souvent difficile de se procurer.

Il n'existe notamment pas un ouvrage de langue française où se trouvent les détails indispensables de la technique de la réaction.

Il nous a semblé qu'il serait utile de réunir tous ces

faits épars, de les classer, de les résumer plus ou moins longuement suivant leur importance.

Pour la description de la technique, nous avons suivi presque littéralement Abderhalden lui-même (Abwehrfermente des tierischen Organismus), en laissant de côté la méthode polarimétrique dont l'emploi semble réservé aux laboratoires spécialement outillés.

Pour classer notre bibliographie, nous avons également adopté l'ordre de l'auteur allemand. Son ouvrage renferme des références très complètes que nous avons cru devoir reproduire en y adjoignant l'indication des travaux que nous avons relevés nous-même.

Nous avons réuni un ensemble de documents que nous nous sommes efforcés d'ordonner, heureux si nous avons pu faciliter de la sorte la tâche de ceux qui emploieront la technique d'Abderhalden, et ils seront nombreux.

Enfin nous terminons en rapportant quelques expériences personnelles, entreprises dans la direction que M. le Professeur Richet nous a fait l'honneur de nous indiquer.

PRINCIPE DE LA RÉACTION

Nous ne pouvons définir les ferments de défense d'Abderhalden, autrement qu'en indiquant leur mode d'obtention et leur action.

Les processus de digestion, a dit Abderhalden, sont des processus universels dans l'organisme, et infiniment plus répandus qu'on ne l'a cru.

Les premières diastases ont été, sans doute, des liquides de sécrétion, des liquides extra-cellulaires, car ce sont les plus faciles à étudier parce que plus faciles à obtenir en grande quantité, très actifs, et parce que leur action, facile à reproduire *in vitro*, est la première qui tombe sous nos sens.

Mais ce pouvoir fermentaire n'est pas l'apanage exclusif de certains groupes cellulaires. Toutes les cellules le partagent à un degré plus ou moins élevé, même les globules sanguins.

Et depuis quelques années, de nombreux faits expérimentaux confirment cette manière de voir.

Le phénomène est plus général que l'organisme humain. En même temps qu'on imagine de nouvelles tech-

niques, on découvre de nouvelles sources de diastases intra-cellulaires.

On a mis en évidence de la zymase dans la levure de bière, soit par broyage et expression comme Buchner, soit par putréfaction comme Lebedeff.

Par des autolyses aseptiques ménagées, bien conduites, on peut mettre en évidence des produits de réaction fermentaires intra-cellulaires ; enfin, ce que nous savons actuellement sur la réversibilité des phénomènes diastatiques, particulièrement grâce aux travaux de Bourquelot, nous permet de comprendre que des variations dans les circonstances permettent d'inverser le sens de la réaction et de remplacer par des phénomènes de synthèse les processus de décomposition.

En un mot les phénomènes diastatiques sont généraux, particulièrement les phénomènes diastatiques intra-cellulaires.

Remarquons d'ailleurs qu'en pareille matière les expériences négatives ont bien rarement une signification. De ce qu'on ne peut, dans un cas déterminé, mettre en évidence une action fermentaire, ceci ne signifie qu'une chose ; c'est que la technique employée ne donne pas de résultat, et non point qu'on ne pourrait en obtenir par une autre plus appropriée ou plus délicate. Il n'existe pas ici de méthode analytique dichotomique, comme il en existe pour la recherche des métaux en chimie minérale.

Dans le sérum normal de l'homme, on n'a pas pu mettre en évidence de ferments capables de dédoubler les peptones et les polypeptides. Chez le cobaye, il en est au-

trement ; le sérum de cet animal jouit de la propriété de décomposer les polypeptides indécomposables par les sérums d'autres animaux.

N'existe-t-il pas une manière de faire acquérir au sang d'autres animaux cette propriété ?

Abderhalden a réussi en injectant dans la cavité abdominale de chiens et de lapins des albumines étrangères (ovalbumine, sérum albumine de bœuf).

Il a constaté que le sérum des animaux ainsi injectés avait acquis la propriété de décomposer les mêmes albumines que celles qui lui avaient été injectées.

Comment Abderhalden a-t-il constaté cette décomposition ? De la même manière que l'on constate, au polarimètre, la décomposition du saccharose par hydrolyse acide en un molécule de glucose et un de lévulose. Dans un mélange, le pouvoir rotatoire est égal à la somme des pouvoirs rotatoires des différents composants. Dans le cas simple du saccharose, on peut en prenant le pouvoir rotatoire avant et après une hydrolyse partielle connaître la quantité de glucose et de lévulose formés.

Il en est de même avec la décomposition des albuminoïdes bien que le phénomène soit infiniment plus compliqué, puisqu'au lieu qu'il se forme seulement parties égales de deux corps définis dont nous connaissons bien le pouvoir rotatoire, il prend naissance, dans ces expériences, un grand nombre de corps complexes dont nous ignorons les proportions et le pouvoir rotatoire.

Nous ne pouvons que constater s'il y a ou non une variation dans le pouvoir rotatoire, sans pouvoir en tirer des déductions qualitatives ou quantitatives. C'est

pourquoi les objections faites par Evler (juin 1913) à la technique que nous allons exposer témoignent ainsi que le fait remarquer Abderhalden « d'idées un peu simplistes au sujet de la constitution des molécules albuminoïdes ».

Voici les grandes lignes de la technique suivie par Abderhalden.

Il prend du sang d'un animal auquel il a injecté antérieurement une albumine ou une peptone. Il le laisse coaguler ou bien le traite par l'oxalate d'ammoniaque et centrifuge. Il ajoute à ce sérum une solution de ce même albuminoïde qu'il a injecté à l'animal. Il remplit de ce mélange un tube polarimétrique qu'il porte dans le polarimètre. Un dispositif spécial permet de maintenir la température du tube polarimétrique constante à 37°.

On observe s'il y a une rotation, et sa grandeur.

Puis on suit la marche du phénomène en notant toutes deux heures par exemple, la rotation observée.

Une variation notable indique une décomposition de l'albuminoïde sous l'influence d'un ferment contenu dans le sérum.

Naturellement, on fait une expérience témoin, avec la même peptone et le sérum d'un animal neuf. Dans ce cas, il n'y a pas de variation du pouvoir rotatoire.

Les expériences primitives d'Abderhalden ont porté sur de nombreux produits : ovalbumine, sérum de bœuf, de cheval, peptone de soie, peptone de gélatine, d'édéstine et de caséine et aussi sur de l'édéstine et de la caséine elles-mêmes.

Le résultat fut toujours identique. Il y eut toujours

obtention d'un sérum doué d'un pouvoir de décomposition, avec variation subséquente du pouvoir rotatoire.

Si le sérum a été chauffé à 60°, il est inactivé.

Si au lieu d'une albumine naturelle, on injecte une albumine iodée, le sérum n'acquiert plus de pouvoir fermentaire.

Abderhalden a fait une autre constatation très importante. Si à un animal d'une espèce A, on injecte le sang d'un animal d'une même espèce A, le sang du premier animal n'acquiert aucune propriété fermentaire.

Mais si on injecte à ce même animal d'espèce A, le sang d'un animal d'une espèce B, le sérum de cet animal acquiert des propriétés actives vis-à-vis des albuminoïdes.

Ce fait mérite une place importante dans l'histoire des spécificités humérales.

Le temps qui s'écoule entre l'injection et l'apparition du pouvoir fermentaire dans le sérum varie entre un quart d'heure (injection de saccharose intra-veineuse) et trois à quatre jours (injections sous-cutanées d'albuminoïdes).

Dans certains cas ce pouvoir a persisté pendant trois semaines.

On pouvait se demander si le sérum des animaux traités était uniquement actif vis-à-vis des albuminoïdes, ou si le phénomène était plus général et s'étendait aux graisses et aux hydrates de carbone.

L'expérience a montré qu'un animal injecté avec des protéines et certaines peptones donne un sérum uniquement actif vis-à-vis des protéines et peptones et de leurs

familles. Les hydrates de carbone ni les graisses ne sont modifiés.

Réciproquement, un animal injecté avec une graisse ou d'un hydrate de carbone ne fournit un sérum actif que vis-à-vis des corps qui lui furent injectés.

L'emploi du polarimètre modifié pour permettre de maintenir la température constante exige l'emploi d'un appareil spécial d'un prix élevé et d'un maniement délicat.

Abderhalden eut l'idée d'employer une autre technique pour mettre en évidence la dislocation de la molécule albuminoïde sous l'influence du ferment.

On sait que, semblablement à l'osmose gazeuse, la dialyse à travers une mince paroi se fait d'autant plus vite que les molécules qui dialysent sont plus petites. Autrement dit, dans un même temps, à travers un même dialyseur il passera d'autant plus de molécules qu'elles seront plus petites.

Etant donné un mélange de molécules grosses et petites, en choisissant bien son dialyseur, on peut obtenir qu'il passe une forte proportion des petites molécules et aucune des grosses.

Abderhalden a réussi à faire préparer des dialyseurs tels qu'ils ne laissent pas passer les molécules albuminoïdes (grosses) du sérum, et laissent passer les molécules de polypeptides (petites) qui se forment lorsqu'un ferment agit sur ces albuminoïdes.

On comprend donc en quoi consiste le principe de sa méthode : mettre dans un dialyseur approprié le sérum présumé contenir un ferment actif vis-à-vis d'un albu-

minoïde, et une petite quantité de cet albuminoïde.

On place le dialyseur dans de l'eau distillée. Si au bout d'un certain temps il est passé dans cette eau distillée des produits donnant les réactions colorées des peptones et des acides aminés, c'est qu'il y a dans le sérum un ferment capable de décomposer les grosses molécules d'albumine en molécules beaucoup plus petites, assez petites pour passer à travers le dialyseur.

(Nous indiquerons plus loin les détails de la technique décrite minutieusement par Abderhalden.)

On pourrait être tenté d'utiliser l'intensité de la réaction colorée pour en tirer des indications quantitatives sur l'abondance du ferment. De pareilles interprétations ne sont pas licites, ainsi que l'a d'ailleurs signalé Abderhalden, parce que nous ignorons la proportion respective de polypeptides formés, laquelle est probablement très variable, et que chaque polypeptide ou acide animé formé donne naissance sous l'influence du réactif employé à une coloration qui lui est spéciale, la réaction colorée totale, la seule que l'on constate, n'étant que la somme de toutes ces colorations particulières.

Pour la même raison on ne peut déterminer le seuil de sensibilité de la réaction.

Nous avons vu plus haut que tous les albuminoïdes étrangers exogènes injectés par Abderhalden avaient produit un anti-ferment. Mais on peut rencontrer dans le sang des produits qui lui soient étrangers, bien qu'ayant été formés par l'organisme lui-même.

Pendant la gestation on trouve dans le sang mater-

nel des villosités provenant des franges du chorion. Le fait est déjà assez anciennement connu. Au début on l'avait supposé pathologique mais bien vite on a reconnu qu'il était normal.

Abderhalden eut l'idée de considérer ces franges comme des albuminoïdes étrangers à l'organisme maternel, et de rechercher si elles ne provoquaient pas un anti-ferment.

L'expérience a été positive. La « Réaction d'Abderhalden » était trouvée.

Naturellement s'en suivirent toutes les expériences où ce moyen de diagnostic fut étendu à d'autres états que la grossesse: au cancer, aux maladies des glandes à sécrétion interne, aux maladies nerveuses.

Mais ce qui semble assez curieux pour que nous le notions immédiatement, c'est qu'il est à présent prouvé, par des travaux récents, que les villosités choriales ne jouent pas de rôle dans la question. La réaction peut s'obtenir avec du placenta de jument, placenta dépourvu de villosités choriales.

Un nombre énorme de chercheurs, notre bibliographie en fait foi, se sont adonnés à l'emploi de cette méthode pour le diagnostic des maladies les plus diverses. Outre leur intérêt pratique, ces travaux sont d'une importance théorique considérable.

S'il est définitivement prouvé que le sérum d'un sujet n'acquiert de propriétés fermentaires que vis-à-vis de l'organe lésé, en mauvais état fonctionnel, cause de la maladie, on conçoit l'importance diagnostique considérable de l'étude systématique des réactions sériques sur les organes les plus variés.

Maintenant que nous avons brièvement indiqué le principe de la réaction d'Abderhalden et les voies par lesquelles l'auteur y a été conduit, nous allons entrer dans les détails de la technique, puis nous passerons en revue les travaux des différents chercheurs qui, dans ces derniers mois, ont étudié cette réaction dans les divers états pathologiques.

TECHNIQUE ET RÉSULTATS CLINIQUES DE LA RÉACTION D'ABDERHALDEN

I. — Préparation du matériel

Dialyseurs. — Abderhalden indique que la maison Schleicher et Schüll vend des dialyseurs et que la maison Schöeps, à Halle, en livre de tout éprouvés. Mais il est bon d'essayer ces filtres soi-même. Ils doivent être imperméables à l'albumine et perméables à ses produits de dégradation.

Epreuve de l'imperméabilité à l'albumine :

On emploie soit de l'albumine d'œuf diluée (5 cmc. de la partie liquide d'un blanc d'œuf frais amenée à 100 cmc. avec de l'eau), soit du sérum sanguin (1).

Pour se servir des dialyseurs, on les ramollit par un séjour d'une heure dans l'eau froide. On les place ensuite dans un petit Erlenmeyer dont le col est d'un diamètre à peine supérieur à celui du dialyseur.

On place alors dans le dialyseur 2 cmc. 5 de solution d'albumine, mesurés à la pipette. Pour laisser s'écouler la solution on entre profondément la pointe de la pipette dans le dialyseur. On doit éviter avec soin que la face externe du dialyseur soit touchée par la solution d'albu-

1. Voir page 124 « Expériences personnelles ».

mine, sans quoi le liquide extérieur donnerait forcément la réaction du biuret. Puis on ferme l'extrémité supérieure du filtre en le serrant entre le pouce et l'index et on le lave sous un courant d'eau. On reprend ensuite ce dialyseur de la même façon mais en le serrant cette fois par son milieu. On lave ainsi la partie supérieure du dialyseur qui est au-dessus du liquide de dialyse et qui n'est pas protégée par le toluène. Enfin, serrant toujours le dialyseur avec les doigts, on chasse l'eau par la partie supérieure.

Cette manipulation a pour but d'enlever toute trace d'albumine, laquelle accidentellement pourrait souiller la partie supérieure du dialyseur, s'y dessécher et tomber ultérieurement dans le dialysat.

Il importe de ne pas laisser pénétrer d'eau dans le contenu du dialyseur et d'avoir les mains extrêmement propres. On peut employer des pinces larges à bords parallèles.

On replace alors les dialyseurs dans les Erlenmeyer remplis de 20 centimètres cubes d'eau distillée stérilisée. On recouvre l'eau distillée et le contenu du dialyseur d'une couche de toluène de 1/2 centimètre de haut.

Il ne faut jamais remplir les dialyseurs lorsqu'ils sont déjà dans les Erlenmeyer (1), une goutte de liquide

1. Contrairement à ce qu'indique M^{lle} Sabin dans un article de la *Presse médicale* (13 déc. 1913), Abderhalden dit : Niemals darf das Beschicken der Dialysierhüsen in den Kölbchen geschehen, in denen man die Dialyse vornehmen will. (Abwerfermente... 3^e édition, p 146, première ligne et suivantes.)

pourrait tomber de la pipette et souiller ainsi le dialysat.

Chaque Erlenmeyer est fermé avec un verre de montre, soigneusement numéroté et porté à l'étuve. On peut également laisser les vases à la température ordinaire, mais ce procédé semble moins favorable.

On abandonne les Erlenmeyer à l'étuve pendant seize heures. Le temps ne joue d'ailleurs aucun rôle dans cette épreuve. Au bout de seize heures, on prélève avec une pipette 10 centimètres cubes du dialysat. On a soin de fermer l'extrémité supérieure de la pipette avec l'index tant que la pointe n'a pas traversé la couche de toluène : on doit changer de pipette à chaque dialysat, et veiller surtout à ce que les pipettes soient rigoureusement propres.

On verse ces 10 centimètres cubes dans un tube à essai et on ajoute environ 2 cmc. 5 de solution de soude à 33 %. On mélange en agitant le tube à essai, et non pas en le secouant après l'avoir fermé avec le pouce, procédé qui pourrait introduire des impuretés.

L'addition de la soude trouble souvent le dialysat. Ce phénomène n'influe pas sur la réaction.

Enfin sur le liquide ainsi obtenu on effectue la réaction du biuret, en ajoutant goutte à goutte une solution de sulfate de cuivre à 1/500 (1).

On pourrait penser employer la réaction de la ninhydrine (nom commercial de l'hydrate de tricetohydrindène), mais elle n'est pas particulièrement sensible pour l'albumine. La ninhydrine réagit, en effet, en donnant

1. Rappelons que la coloration du Biuret est violette, et non pas verte, comme le dit M^{lle} Sabin (*loco citato*).

une coloration violette, sur les combinaisons qui ont un groupe aminé en position et par rapport au carboxyle.

La grosse molécule d'albumine ne renferme pas beaucoup de groupes libres aminés et carboxyles, mais ces groupements sont mis en liberté lors de la décomposition de cette molécule.

Epreuve de la perméabilité des dialyseurs aux produits de décomposition de l'albumine

Les dialyseurs reconnus imperméables à l'albumine sont vidés et lavés. On les place, par exemple, sur un tamis sous un courant d'eau pendant une demi-heure. Pour plus de sûreté on peut les plonger dans de l'eau bouillante, un quart de minute tout au plus. L'eau bouillante présente l'inconvénient de rendre facilement les filtres trop denses.

On place alors dans les dialyseurs 1 centimètre cube d'une solution à 1 % de peptone de soie (on en trouve en vente, en France, sous le nom de séricine ou Seidenpeptone de Hoechst). On lave les filtres à l'eau distillée et les place dans les Erlenmeyer remplis de 20 centimètres cubes d'eau distillée. Comme précédemment on recouvre de toluène et on porte à l'étuve.

Après seize heures, on recherche dans le dialysat la réaction à la ninhydrine.

La sueur et les cellules épidermiques donnant fortement la réaction avec la ninhydrine, il ne faut pas toucher le dialyseur avec les mains, mais utiliser des pinces flam-

bées. Tout le matériel doit être absolument propre et sec.

On doit disposer d'autant de pipettes que d'essais à faire. Il faut prêter une grande attention au moment où la pointe de la pipette traverse la couche de toluène, la présence du toluène pouvant troubler la réaction.

On ajoute à 10 centimètres cubes du dialysat 0 cmc. 2 de solution aqueuse à 1 % de ninhydrine. La solution de ninhydrine est mesurée avec une pipette étroite de 1 centimètre cube graduée en dixièmes.

Après avoir versé dans le tube à essai 0 cmc. 2 de ninhydrine, on ajoute la « baguette à bouillir ». Celle-ci est absolument indispensable : elle régularise l'ébullition et permet ainsi d'obtenir des réactions colorées comparables.

Les baguettes à bouillir du commerce sont des petits morceaux de bois, un peu moins gros qu'un crayon. Elles ont environ 10 centimètres de long. On les fait bouillir dans de l'eau distillée, on les sèche à 60-70° et les conserve dans un vase fermé.

Ces baguettes ne doivent pas être conservées à l'humidité. On ne les touche jamais avec les mains mais avec les pinces.

La manière de conduire l'ébullition est également de première importance. On doit chauffer fortement en

1. Pour dissoudre rapidement la ninhydrine, il faut un peu chauffer. Le mieux est de mettre à l'étuve.

Les solutions ne sont pas d'une conservation indéfinie. On peut les garder dans des flacons bruns, mais en n'en préparant que 10 centimètres cubes à la fois, on aura utilisé cette quantité avant qu'elle se soit décomposée.

évitant toute projection de liquide ou une évaporation irrégulière.

On porte dans la pleine flamme d'un brûleur de Bunsen, on note le dégagement des premières bulles sur la paroi du tube à essai, et on chauffe exactement une minute à partir de ce moment.

Au bout de dix à quinze secondes l'ébullition devient vive, on porte le tube sur le bord de la flamme et on la règle à la moitié de sa hauteur. La régularité des résultats dépend de la régularité du chauffage.

On chauffe tous les tubes et on s'assure qu'il y a la même hauteur de liquide dans chacun. (On peut utiliser des tubes jaugés à 10 cmc.)

On attend ensuite une demi-heure et on compare l'intensité des réactions obtenues.

On note l'intensité obtenue pour chaque dialyseur, fait qui sera important à connaître, dans la suite, pour permettre de comparer entre eux les résultats ultérieurs.

On rejette les dialyseurs ayant fourni des colorations trop fortes ou trop faibles.

Les filtres reconnus perméables sont lavés, plongés trente secondes dans l'eau bouillante, et placés dans un flacon stérilisé. On ajoute de l'eau stérilisée pure, puis une égale quantité de toluène. Le flacon doit toujours être plein de liquide.

Les dialyseurs sont maintenant tout prêts à être utilisés. Ils seront saisis avec une pince stérilisée et il vaut mieux ne jamais les toucher avec les doigts.

Préparation du substratum (organe)

On emploie soit une albumine, soit un mélange d'albumine tel qu'un organe.

Nous prendrons comme exemple la préparation du placenta. Les autres organes devant être préparés de la même façon :

Les organes très riches en matières grasses et lipoides sont au préalable épuisés au Soxhlet avec du tétrachlorure de carbone (par exemple, les bacilles tuberculeux).

On pourra toujours se procurer du placenta frais.

Les autres organes seront prélevés sur le cadavre le plus tôt possible, de préférence sur des cadavres d'accidentés, car, après une longue agonie, les organes sont inemployables. Le choix des organes est très important; il faut s'assurer qu'ils n'ont point subi de modifications pathologiques.

Les organes doivent être absolument débarrassés de toute trace de sang. Cette opération est plus ou moins facile : le placenta, les poumons peuvent être assez rapidement débarrassés du sang; le foie, le rein, l'uvée surtout offrent beaucoup plus de difficulté.

Le placenta frais, encore chaud, abandonne mécaniquement ses caillots sans grandes difficultés. On a soin également d'enlever les débris de membranes et de cordon. Lampé indique qu'une technique recommandable pour nettoyer de sang le placenta consiste à le laver en enfilant une canule dans les veines ombilicales.

On divise le placenta en fragments de la dimension d'une pièce d'un franc. On le triture dans un jet d'eau courante. La meilleure technique consiste à placer les fragments sur un tamis, sous un courant d'eau. On exprime chaque fragment à la main.

De temps en temps on enveloppe les fragments du placenta dans un linge, et on les presse fortement. Le lavage de ces fragments ne doit jamais être interrompu.

On rejette les fragments contenant du sang caillé difficile à enlever.

Finalement les morceaux sont triturés dans un mortier avec un pilon. On rejette alors les fragments de tissu conjonctif.

A ce moment on obtient un tissu « blanc comme la neige ».

Suivant la nature du tissu cette manipulation dure de une heure à trois heures.

Un autre procédé consiste à laisser l'organe deux à six heures à la glacière, après l'avoir saupoudré de gros sel. Au bout de ce temps on lave l'organe.

On ne peut recommander le procédé consistant à décolorer l'organe par l'eau oxygénée. Le sang décoloré devient difficilement visible, partant on risque de ne pas en nettoyer complètement l'organe.

Pour plus de sûreté, on peut vérifier au moyen du spectroscope qu'il ne reste plus de sang.

On fait ensuite bouillir les fragments d'organe « blancs comme neige » dans un vase d'émail contenant 100 fois le poids du tissu d'eau distillée. Abderhalden recommande d'ajouter 5 gouttes d'acide acétique par litre

d'eau. On fait bouillir pendant dix minutes, on verse le contenu du vase sur un tamis et on lave le tissu pendant cinq minutes avec de l'eau distillée.

On recommence alors le chauffage avec une nouvelle quantité d'eau à laquelle, cette fois, on n'ajoute pas d'acide acétique.

On recommence 6 fois cette série d'opérations.

Si l'on est obligé d'interrompre le chauffage, il ne faut pas négliger de placer une forte quantité de toluène sur l'eau contenant le tissu.

Par centrifugation on débarrasse enfin l'organe de son eau de cuisson. Cette opération est indispensable lorsqu'on traite des organes très denses ou des cultures bactériennes.

Après la sixième ébullition on reprend le tissu par cinq fois son volume d'eau ; moins il y aura d'eau, plus sera sensible, en effet, la réaction à la ninhydrine portant sur un liquide concentré.

Au bout de cinq minutes d'ébullition, on filtre sur un filtre durci. A 5 centimètres cubes du filtrat on ajoute au moins 1 centimètre cube de la solution ninhydrine à 1%. et on chauffe pendant une minute, comme nous l'avons indiqué plus haut.

Si après une demi-heure il ne s'est pas produit la plus légère coloration violette, l'organe a été bien préparé.

Nous avons vu déjà que le foie, la rate et le rein, n'arrivent jamais à être « blancs comme neige ».

Avant d'utiliser un organe, on place chaque fragment sur une plaque de verre ou sur une feuille de papier blanc. Si on remarque alors sur les fragments quelques

points bruns, quelques traces persistantes de sang, on rejette ces fragments.

On place ensuite les fragments utilisables dans un flacon stérilisé, bouché à l'émeri.

Les organes peuvent se conserver ainsi indéfinitivement. On recommande de placer le flacon dans la glacière.

Les organes très consistants ou ceux que l'ébullition rend compacts réclament une technique particulière.

Les carcinomes, les myomes par exemple, bien que « blancs comme neige », peuvent cependant contenir encore du sang à leur intérieur. Il faut, pour éviter cette cause d'erreur, les hacher en morceaux très fins.

Le placenta ne doit être employé que s'il n'est pas décomposable par le sérum de malades atteints de carcinome, de salpingite, de tuberculose.

De même le tissu carcinomateux bien préparé ne doit pas être décomposé par du sérum de femme gravide.

Abderhalden recommande enfin, par-dessus tout, d'éprouver les organes vis-à-vis des ferments susceptibles de décomposer les globules rouges. Le sérum d'un sujet en proie à une hémorragie est un matériel très favorable pour cette épreuve.

Un autre procédé pour obtenir un sérum approprié à cette épreuve consiste à injecter à un animal du sang étranger et à examiner ensuite la réaction du sérum de l'animal sur l'organe à éprouver.

Cette épreuve est indispensable, car il faut être tout à fait certain que ce sont les protéines de l'organe qui

seront décomposées et non pas celles du sang qui aurait pu y demeurer à la suite d'un nettoyage incomplet.

Le sérum provenant d'animaux porteurs d'hématomes réagit positivement sur les organes qui contiennent encore du sang et négativement sur les organes qui en sont complètement débarrassés.

Le placenta de la femme peut être remplacé par certains placentas d'animaux (voir plus loin Schlumpert et Issel ; v. Hippel et Inschs et nous-mêmes).

Obtention du sérum

Le sérum doit être aussi pauvre que possible en substances dialysables réagissant avec la ninhydrine.

On recueille le sang du sujet à jeun. Car dans les cas où le métabolisme est animé et aussi dans des maladies comme le carcinome, dans la résorption des exsudats et des transsudats, le sang contient toujours une grande proportion de ces substances dialysables.

On prélève le sang avec une aiguille absolument sèche et on le recueille dans un tube à essai ou mieux dans un Erlenmeyer. On laisse le sérum se séparer. On laisse le sang à la température ordinaire, il ne faut le placer ni à la glacière (1) par crainte de l'hémolyse, ni à l'étuve, par crainte de l'autolyse des éléments figurés. Au bout

1: Ainsi que le dit M^{lle} Sabin dans le numéro du 13 décembre 1912 de la *Presse médicale*.

de cinq ou six heures on décante le sérum et on le centrifuge.

Le sérum ne doit renfermer ni hémoglobine, ni éléments figurés. Un sérum clair peut encore renfermer des billions de globules rouges.

On doit donc centrifuger, avec un centrifugeur électrique, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus retrouver de globules rouges au fond ou sur les parois du tube.

Après chaque centrifugation on transvase le sang avec une pipette dans un autre tube à centrifuger.

On prélève 1 cmc. 5 du sérum pour le contrôler et on fait la recherche de l'action du sérum sur le placenta avec le reste ; 15 à 20 centimètres cubes de sang suffisent.

Quand on veut expédier du sérum, on le centrifuge au préalable et on le centrifuge de nouveau avant de s'en servir. Le sérum ne doit pas avoir plus de douze heures. Il doit être recueilli et manipulé aseptiquement.

Conduite d'une recherche

1) La plus rigoureuse propreté est nécessaire. Tout le matériel doit être méticuleusement propre et sec.

2) On doit utiliser exclusivement de l'eau distillée et stérilisée.

3) Il faut travailler en milieu aseptique et antiseptique.

4) Dans le laboratoire où ont lieu ces recherches, il faut éviter de faire en même temps de la chimie et sur-

tout de la bactériologie. Une étuve spéciale doit être réservée aux Erlenmeyer.

5) Avant de commencer une série d'expérience on doit vérifier le bon état de tout le matériel et s'assurer un éclairage convenable. On ne peut opérer à la lumière artificielle.

6) Les soins nécessités par les manipulations sont tels qu'on ne peut mener de front plus de 5 à 6 recherches.

7) Avant toute expérience il est nécessaire de connaître parfaitement la technique et la théorie sur laquelle elle repose. Beaucoup de résultats inexplicables, sont imputables à de mauvaises manipulations.

L'organe doit être essayé immédiatement avant chaque recherche, ceci est une règle dont il ne faut jamais se départir.

Pour essayer l'organe, il faut commencer par le dilacerer en petits morceaux avant de le faire bouillir. Ce serait une grosse faute que de le dilacerer seulement après l'ébullition. Un fragment peut en effet toujours renfermer des produits réagissant à la ninhydrine, et que le liquide dans lequel on l'a fait bouillir tout entier ne donne pas la réaction à la ninhydrine parce que ces produits contenus à l'intérieur des fragments ne sont pas passés en solution.

On porte le fragment à l'ébullition pendant cinq minutes, dans cinq fois son poids d'eau, dans un tube à essai. On filtre le liquide sur un filtre durci, le filtrat ne doit pas donner la réaction à la ninhydrine.

Au cas où le filtrat donne une coloration violette avec

la ninhydrine, on recommence une nouvelle ébullition de l'organe avec 5 fois son poids d'eau.

On met dans chaque dialyseur environ un demi-gramme d'organe soigneusement essuyé dans du papier buvard. Il ne faut jamais le toucher avec les mains. Puis on ajoute dans le dialyseur 1 cmc. 5 de sérum.

On fait une expérience de contrôle en plaçant dans un dialyseur vide 1 cmc. 5 de sérum.

On lave les dialyseurs comme il a été dit ci-dessus et on les place dans les Erlenmeyer avec 20 centimètres cubes d'eau distillée stérilisée. On recouvre le tout d'une forte couche de toluène.

A ce moment deux causes d'erreur sont à éviter :

a) L'introduction d'eau dans le dialyseur qui pourrait diluer le dialysat et atténuer sa coloration par le ninhydrine.

b) Si on met dans l'Erlenmeyer trop d'eau et de toluène avant d'y placer le dialyseur, l'introduction du dialyseur fait monter ce liquide jusqu'au niveau du col de l'Erlenmeyer, d'où contact par capillarité entre le contenu du dialyseur et le liquide extérieur.

Nous savons qu'on porte alors les Erlenmeyer dans l'éluve réglée à 37° pendant seize heures. Au bout de ce temps il doit rester encore une couche protectrice importante de toluène.

On retire les dialyseurs et les dispose dans d'autres Erlenmeyer vides.

On prélève 10 centimètres cubes du dialysat, en prenant les précautions antérieurement indiquées et on ef-

fectue la réaction à la ninhydrine dans les conditions énoncées plus haut.

L'ébullition des tubes pouvant ne pas être rigoureusement égale, Abderhalden dit qu'on a eu quelquefois recours au chauffage au bain-marie, pour éviter cet inconvénient; il semble qu'on doive alors chauffer pendant deux ou trois minutes, mais les expériences réalisées dans ces conditions ne sont pas encore assez nombreuses pour qu'on puisse être affirmatif sur le temps exact de chauffage nécessité par ce procédé.

Les tubes à essai utilisés doivent toujours être identiques entre eux.

Si la réaction est trop faible, on peut ajouter encore 0 gr. 2 de ninhydrine et faire bouillir à nouveau pendant une minute.

Plusieurs cas peuvent se présenter :

1° Dialysat du sérum = négatif.

Dyalisat du sérum + organe = négatif également.

Si on opère avec du placenta, il faut simplement en conclure que l'organisme qui a fourni le sérum n'est pas en rapport avec un placenta (femelle non gravide).

2° Dialysat du sérum seul = négatif.

Dialysat du sérum + organe = positif.

On en conclut (dans le cas où l'organe essayé a été le placenta) l'état de grossesse de l'organisme qui a fourni le sérum ou plus exactement le rapport de cet organisme avec un placenta.

3°) Dialysat du sérum seul = positif.

Si le dialysat d'organe + sérum donne également une réaction positive et que cette réaction soit plus forte

que celle du sérum seul on peut considérer le cas comme positif.

Si la différence n'existe pas ou est faible, il faut répéter l'expérience et en employant seulement 1 centimètre cube de sérum.

Il ne faut pas faire la lecture des résultats alors que les tubes sont dans leurs porte-tubes, mais bien les regarder à la lumière sur un fond de papier blanc.

On peut avoir quelques difficultés à interpréter les colorations rougeâtres ou jaunâtres. Il faut alors exécuter dans un autre tube une réaction nettement positive avec de la ninhydrine et diluer le liquide violet ainsi obtenu jusqu'à ce qu'on ait obtenu une coloration d'intensité égale à celle du tube douteux auquel on la compare alors.

La réaction du buiret est employable par ceux qui sont capables de l'apprécier quand elle est faible, mais il est préférable d'employer la ninhydrine.

Causes d'erreurs

Abderhalden signale un certain nombre de causes d'erreur. Aucune n'est en somme bien particulière à la méthode et ses recommandations peuvent s'appliquer à la plupart des recherches biologiques de ce genre. Néanmoins les détails dans lesquels entre l'auteur à ce propos montrent bien que cette réaction est délicate à exécuter, ou tout au moins méticuleuse.

Il faut prêter attention à ce que la température de

l'étuve soit égale en tous les points, et corresponde bien au chiffre du thermomètre (éviter les erreurs dues au rayonnement, à la conductibilité, etc.).

Dans tout le cours des manipulations, il faut éviter les vapeurs acides ou alcalines. Cette prescription doit d'ailleurs être toujours présente à l'esprit de ceux qui manipulent les produits à propriétés diastasiques. On sait l'influence de l'acidité du milieu sur les diverses diastases. Des traces d'acides ou d'alcalis, souvent indécélables par les réactifs colorés suffisent à arrêter complètement une réaction, ou tout au moins à la ralentir dans des proportions qui, pratiquement, équivalent à un empêchement total.

Dans le cas qui nous occupe, il faudra donc opérer dans une atmosphère qui soit pure, et ce n'est souvent pas le cas de beaucoup de laboratoires, particulièrement de laboratoires d'hôpitaux où dans une même salle sont poursuivis concurremment des recherches chimiques et des recherches physiologiques.

Il faut avoir soin d'employer de la verrerie bien sèche. Toute humidité dans la verrerie graduée amène une erreur dans les mesures de volume.

De plus, dans des recherches comme celles-ci, basées sur le pouvoir sélecteur d'un dialyseur, toute addition d'eau change l'équilibre osmotique, et modifie par conséquent les conditions de l'expérience. Pour la même raison, et en plus de celles déjà indiquées, il faudra éviter de manipuler avec les mains les divers ustensiles qui seront en contact avec des liquides. Les doigts, même propres, déposent toujours des traces sur la verrerie. Les

traces sont grasses et pourraient influencer ainsi les conditions de la capillarité et de l'osmose.

En aspirant dans les pipettes, des opérateurs peu soigneux pourraient laisser écouler des traces de salive dans le liquide mesuré. Cet accident survient encore plus facilement à ceux qui ont la mauvaise habitude de souffler dans les pipettes. Or le mélange de la salive avec les liquides de réaction est aussi une cause d'erreur.

Il est inutile d'insister sur la nécessité de mesurer très exactement le volume des réactifs et particulièrement de la ninhydrine.

L'eau distillée employée doit être propre, et souvent tel n'est pas le cas dans les laboratoires. L'eau distillée séjourne longtemps d'abord dans des touries mal bouchées, puis dans les barils des laboratoires, à la chaleur, dans un milieu généralement riche en bactéries.

Des gaz variés s'y dissolvent ; ce n'est point un liquide convenable pour de semblables recherches.

Il vaut mieux redistiller fraîchement de l'eau dans un appareil en verre, et la conserver dans des flacons bien bouchés jusqu'au moment de l'emploi.

Les dialyseurs doivent être l'objet d'une attention particulière. Dans ceux du commerce, on en trouve généralement 20 à 30 % de mauvais et quelquefois 80 %. On ne doit jamais les nettoyer avec une brosse dure, ni les laisser séjourner après une expérience, garnis de leur contenu.

Les parois du dialyseur peuvent, après qu'on s'en est servi, renfermer des traces de matières réagissant avec

la ninhydrine. Cette quantité peut être trop faible pour donner une coloration, mais s'ajoutant à d'autres traces contenues dans le dialysat, devenir décelable par la ninhydrine.

On doit essayer les dialyseurs toutes les quatre semaines.

Le sérum contient toujours plus ou moins de substances dialysables réagissant avec la ninhydrine. Aussi il a fallu beaucoup d'expériences pour déterminer la quantité optima de sérum à utiliser pour que le liquide de dialyse du sérum seul ne réagisse pas avec la ninhydrine.

Il faut en employer 1 cmc. 5.

La ninhydrine réagit avec d'autres combinaisons que les acides aminés, le sucre par exemple.

Cependant la réaction est négative quand on opère avec du sérum seul de diabétique en suivant exactement la technique indiquée.

Enfin Abderhalden indique une méthode qui permet également de vérifier la bonne préparation des organes employés, c'est de les mettre en présence de sérum inactivé à 60° pendant trente minutes.

La réaction doit être négative.

Modifications de la réaction

Rubsamen a proposé un perfectionnement à la technique indiquée par Abderhalden.

Il utilise 4 dialyseurs : dans les 2 premiers il place 1 cmc. 1/2 de sérum l'un avec du placenta, l'autre sans

placenta, dans les deux derniers, il répète la même expérience avec seulement 1 centimètre cube de sérum et il compare les résultats.

King propose d'utiliser du placenta en poudre. Abderhalden répond que cette méthode serait, en effet, employable, mais il rappelle que sous cette forme, le placenta se putréfie rapidement.

Goudsmith indique de préparer le placenta avec de l'eau oxygénée, d'abord à froid en présence d'eau oxygénée à 1,5 %, ensuite à chaud, jusqu'à ce que le liquide en donne plus la réaction des albuminoïdes.

Abderhalden a signalé plus haut que cette modification peut amener à méconnaître dans l'organe, des traces de sang décolorées.

Jaworsky propose d'employer simultanément pour les recherches scientifiques, 4 dialyseurs, afin d'obtenir un liquide représentant le dialysat moyen de 4 épreuves.

Il est impossible de se prononcer actuellement sur la valeur de ces modifications.

APPLICATION DE LA RÉACTION D'ABDERHALDEN AU DIAGNOSTIC DE LA GROSSESSE

Nombre d'auteurs ont répété sur des sérums de femmes gravides la réaction d'Abderhalden. Ils ont employé soit la méthode optique, soit la réaction colorée avec la ninhydrine, soit la réaction du buiret ; certains ont même vérifié leurs résultats en employant concurremment ces procédés.

Nous nous contenterons de rapporter quelques-unes des statistiques publiées à propos de la grossesse normale :

Schiff, examinant 49 sérums prélevés à des femmes gravides, trouve 47 résultats positifs, 2 sérums furent rejetés, l'un parce qu'il était hémolytique, l'autre parce qu'il avait séjourné trop longtemps à la température de la chambre. L'opérateur ignorait les diagnostics cliniques avant d'avoir fait les réactions. Schäfer présente à la société de gynécologie à Halle en mai 1913, 60 cas positifs sur 62 sérums gravides examinés. Au mois de septembre 1913, il publie de nouveau dans le *Berlin*.

Klin. Woch. 70 réactions positives par la méthode de la dialyse sur 72 sérums de femmes gravides. 43 de ces sérums examinés par la méthode optique lui fournissent encore 42 résultats positifs.

Freund et Brahm font porter leurs recherches sur 160 sérums de femmes gravides. Ils obtiennent 75 % de résultats conformes à la réalité clinique en employant le procédé optique, et 69 % en employant la méthode de la dialyse 104 fois ils ont essayé concurremment les 2 méthodes. 31 fois leurs résultats ne furent point concordants.

Ces auteurs pensent que leurs insuccès sont dus non pas à des erreurs de technique, mais à des variations dans les quantités de ferments.

Cette opinion semble difficile à admettre. Ces auteurs sont à peu près les seuls, nous le verrons plus loin, à obtenir une telle discordance de résultats.

Ecalle trouve, par le procédé de la dialyse, 119 réactions positives avec les sérums de 119 femmes gravides.

Daunay et Ecalle communiquant, d'autre part, les résultats fournis par l'examen du sérum de 24 femmes enceintes sont amenés aux conclusions suivantes :

1° Le sérum de la femme gravidë paraît toujours agir sur le placenta. Mais l'intensité de la réaction à la ninhydrine est souvent variable.

2° Le sérum seul peut fournir des produits de dialyse donnant avec la ninhydrine une coloration légère.

Bar, à propos des travaux de Daunay et Ecalle rappelle à la Société d'obstétrique et de gynécologie de Paris, que les premières recherches faites à la clinique

Tarnier, en employant la méthode optique, n'ont donné que des échecs, et seulement des résultats confus par la méthode de la dialyse.

Après un séjour à Halle de Daunay et Ecalles les expériences reprises à nouveau donnèrent les résultats que nous venons d'énumérer. Il conclut : « L'étude de l'agent « actif permettant au sérum d'attaquer le placenta et de « sa signification biologique fait de l'expérience d'Abderhalden une expérience de premier plan. »

Porchownick juge la méthode d'Abderhalden très utile pour le diagnostic de la grossesse à une époque où aucun autre symptôme ne permet d'affirmer la gravidité. Il accuse toujours des réactions positives dans les cas de gravidité.

Judd n'a examiné qu'une trentaine de cas de gravidité. Dans tous il trouve la réaction positive à la ninhydrine. Il cite un cas de grossesse où le laboratoire et la clinique semblèrent au début en désaccord. L'évolution ultérieure prouva que le résultat de la réaction d'Abderhalden était exact.

Judd constate également que les femmes de couleur donnent la même réaction que les femmes blanches.

Enfin, mettant en présence de fragments de placenta des sérums d'hommes, cet auteur n'a trouvé que des réactions négatives.

Félix Deutsch et Robert Kœhler publient que les sérums de 45 femmes gravides ont donné 45 réactions positives en présence de placenta dans le dialyseur.

Ekler examinant 45 sérums de femmes gravides, trouve également 45 résultats positifs.

Aschner rapporte que depuis 1912, le Dr Queisner a pratiqué chez lui 100 examens de sérums provenant de femmes gravides. Les résultats qui ne sont pas encore tous publiés concordent avec les résultats obtenus par Abderhalden. Aschner a lui-même examiné 45 sérums gravides et a trouvé 45 réactions positives.

Il rappelle toutefois qu'au cours d'une série d'expériences, le sérum d'une femme normale, indiscutablement enceinte de six mois, fournit une réaction négative. Cette expérience reprise à l'Institut même d'Abderhalden donna encore un résultat négatif.

Aschner signale encore une autre grossesse de cinq mois où le sérum ne présenta aucune action vis-à-vis du placenta. Il s'agissait d'une femme atteinte d'une adipose considérable, chez laquelle le diagnostic ne put être confirmé que par la radiographie. L'auteur envoya alors du sérum de cette malade à l'Institut d'Abderhalden, cette fois la réaction fut positive.

Tschudnowsky employant simultanément la méthode optique et la réaction de la ninhydrine trouve des résultats concordants entre eux chaque fois que les recherches furent vérifiées par les deux procédés (Voir tableau page 55).

Lichtenstein rapporte 42 expériences avec 42 résultats positifs en faisant agir ces sérums de femmes gravides sur du placenta.

Cet auteur s'attache à définir les conditions dans lesquelles la réaction est positive au cours de la grossesse. Il estime, d'après ses recherches que cette réaction est indépendante de la vie et même de la présence de l'em-

bryon *in utero* (nous verrons plus loin que la réaction demeure positive quelque temps après l'accouchement); il pense que cette réaction est intimement liée au passage dans le sang de produits venant de l'œuf.

Il ajoute, que la réaction devient négative, alors même que l'utérus est habité, si une circonstance anormale interrompt les échanges entre la mère et le fœtus.

L'auteur cite un cas clinique confirmant son hypothèse : une femme ayant déjà atteint l'âge de la ménopause, n'est pas réglée pendant deux mois. L'utérus augmente de volume, sans présenter toutefois les signes caractéristiques d'un utérus gravide. Le sérum placé dans le dialyseur en présence de placenta, ne donne aucune réaction.

Le chirurgien procède alors à l'introduction d'une laminaire. Le col étant dilaté livre passage à un fœtus macéré et à son placenta. Ce fœtus est aplati, il mesure 1 cm. 1/4 de longueur, il a dû mourir trois à quatre semaines avant l'avortement provoqué. On remarque sur le placenta un petit caillot déjà ancien.

Depuis trois semaines aucun échange nutritif ne se produisait évidemment plus entre la mère et l'enfant. Ce fait peut expliquer le résultat négatif fourni par la réaction.

Lichtenstein rappelle enfin qu'il a été chez Abderhalden emportant 4 échantillons : 2 échantillons de sérums de femmes gravides, 2 échantillons de sérums de femmes non gravides.

Ces échantillons portaient des numéros correspondant à des indications placées dans une enveloppe cachetée,

laquelle ne fut ouverte qu'après les essais. Les recherches faites au laboratoire d'Abderhalden, par la méthode optique, donnèrent des résultats exacts.

Ewler confirme les résultats de Lichtenstein.

Gambaroff publie 22 résultats positifs pour 22 sérums de femmes gravides essayés.

La réaction d'Abderhalden a été fortement discutée par Wimvorter. Cet auteur a expérimenté sur 283 sérums. Il publie que non seulement les sérums de femmes gravides lui ont fourni des résultats positifs, mais qu'il a obtenu des réactions analogues en employant les sérums de malades atteintes de carcinomes, etc. Selon lui, les sérums des femmes présentant des lésions utérines réagissent positivement sur le placenta dans 4/10 des cas. Il ajoute, de plus, qu'il a constaté plusieurs réactions négatives au cours de grossesses indiscutables.

Wimvorter insiste sur ce fait qu'à propos de chaque sérum il a répété l'expérience 10 ou 12 fois. Il assure que dans ces conditions il a toujours constaté au moins une réaction négative, quelquefois même 5 ou 6 réactions négatives sur les 10 ou 12 expériences, alors que la gravidité des femmes dont on étudiait le sérum ne faisait aucun doute.

Il cite un cas où 6 essais tentés avec un même sérum fournirent 3 résultats positifs et 3 résultats négatifs.

Cet auteur conseille donc de faire toujours, pour chaque sérum, une série d'essais.

Hiess et Lœderer trouvent, dans 45 cas de grossesses normales, 43 réactions positives.

Parsamow conclut ainsi ses recherches : « une réaction « négative signifie bien : pas de grossesse, mais une « réaction positive ne signifie pas forcément grossesse ».

Behne a été apprendre auprès d'Abderhalden le procédé de la dialyse. Sur 12 sérums de femmes enceintes, il accuse 11 réactions positives.

William et Pearce l'ont remarquer que des fragments de cœur, de rein et d'utérus, convenablement préparés, peuvent fournir aussi bien que des morceaux de placenta des réactions positives lorsqu'ils sont mis en contact avec des sérums de femmes en gestation.

Or nous avons déjà vu que dans son « Abwehrfermente des tierischen organismus ». Abderhalden avait prévu ces objections. Les résultats contradictoires tiennent presque toujours à une préparation défectueuse de l'organe employé pour la réaction. Abderhalden insiste sur ce fait que les organes très consistants ou ceux que l'ébullition rend compacts réclament une préparation spéciale.

De plus, le placenta ne doit être utilisé que s'il n'est pas décomposé par le sérum de malades atteints d'affections utérines, de tuberculose, de néoplasme, etc.

R. Labusquière signale, en France, cette réfutation, dans un article sur le diagnostic physiologique de la grossesse et rappelle que la dernière monographie d'Abderhalden, en décembre 1913, indique 600 diagnostics de grossesses faits à l'aide de ces méthodes, sans aucun résultat contraire à la réalité.

En février 1914, Allmann confirme la spécificité de la

séro-réaction de la grossesse. Il cite 48 résultats nettement positifs pour 48 sérums de femme gravide essayés.

Il nous semble donc légitime de conclure de tout ceci à la grande valeur de la réaction d'Abderhalden appliquée au diagnostic de la grossesse.

A ce propos nous ferons remarquer que, si dans bien d'autres réactions biologiques utilisées en vue de différents diagnostics on peut, dans les cas où le laboratoire donne une réponse affirmative, être tenté de forcer un diagnostic clinique hésitant, dans la grossesse, au contraire, nul doute ne peut subsister sur l'exactitude du diagnostic. Il suffit d'attendre tout au plus neuf mois.

Et cette vérification absolue des résultats, vérification indiscutable et vivante, rend plus admirable encore la précision des résultats obtenus grâce à la réaction d'Abderhalden.

Recherche de la réaction dans le sérum de femmes non enceintes

On trouve parmi les conclusions que tirent Daunay et Ecalles des résultats de leurs expériences sur la réaction d'Abderhalden cette remarque. « Le sérum de la femme
« non enceinte, additionnée de placenta, peut donner des
« produits de dialyse, décelables par une réaction colorée
« avec la ninhydrine. »

Nous verrons plus loin que, dans certaines conditions pathologiques, les sérums de femmes non enceintes peuvent réagir positivement sur le placenta, nous nous

contenterons de signaler dans le présent chapitre, les cas positifs obtenus avec des sérums de femmes non gravides ne présentant aucun symptôme morbide décelable.

Schæfer examine 41 sérums de femmes normales, non en gestation, et trouve seulement 38 réactions négatives par la méthode de la dialyse, 17 de ces sérums examinés par la méthode optique donnent 17 réactions négatives.

Ecalte, sur 44 sérums de femmes non enceintes, trouve 10 réactions positives.

Mais Porchownick prétend que les colorations données avec la ninhydrine dans ces cas sont impossibles à confondre avec la coloration normale positive caractéristique de la grossesse.

Judd a contrôlé la valeur de la réaction en faisant dialyser, avec le placenta, des sérums d'hommes bien portants, de vierges, de femmes non enceintes, de femmes au delà de la ménopause. Il obtient régulièrement des résultats négatifs.

Les résultats, dit-il, sont également négatifs si on fait agir sur le placenta des sérums de femmes non enceintes, mais atteintes de syphilis, néoplasme malin du col, septicémie généralisée, endocardite, etc.

Il conclut qu'en procédant avec toute la rigueur nécessaire les résultats obtenus ne font que confirmer la valeur du séro-diagnostic de la grossesse par Abderhalden.

Félix Deutsch et R. Kœttler ont examiné les sérums des femmes normales au moment de la menstruation, ils ont trouvé, pour 10 sérums examinés, 6 réactions

positives, mais faiblement positives, en présence de placenta.

Ekler ne signale pas un cas positif avec du sérum de femme normale non gravide ; Parsamow relate à la même époque qu'il a obtenu 2 réactions positives en mettant en présence du placenta des sérums d'hommes bien portants et Neuc signale que plusieurs sérums de femmes non enceintes ont décomposé le placenta.

Grossesse extra-utérine

Il était fort important au point de vue clinique de déterminer la valeur de la réaction d'Abderhalden dans des cas de grossesse extra-utérine.

Schæfer rapporte que 14 sérums prélevés dans des cas de grossesses extra-utérines, vérifiées par l'intervention chirurgicale, réagirent 10 fois positivement sur le placenta (méthode de la dialyse) 6 de ces sérums examinés par la méthode polarimétrique donnèrent 5 réactions positives.

Eckler signale qu'il a toujours constaté des résultats positifs dans ces conditions pathologiques ; Maccabruni présente 4 réactions positives dans 4 cas de grossesse extra-utérine et 1 réaction positive dans un cas de môle hydatiforme.

L'étude de cette question fournit à Lichtenstein la matière d'une intéressante publication.

L'auteur rapporte 3 cas :

I) Une jeune femme dont les dernières règles remou-

taient au 9 juin 1912, se plaint le 9 septembre de douleurs abdominales aiguës. Les douleurs durent quelques jours, puis disparaissent. Des crises semblables, suivies de périodes d'accalmie, se répètent jusqu'au 15 novembre.

De décembre 1912 à mai 1913, la femme présente toutes les quatre ou cinq semaines, des pertes de sang irrégulières en intensité et en durée, non douloureuses. En mai 1913, les crises douloureuses réapparaissent.

Le 23 mai la malade expulse, avec des fèces, des extrémités fœtales et des os du crâne. On sent, par le palper, des crépitations osseuses dans la région ombilicale.

Le 7 juin, l'état de la malade s'étant subitement aggravé, on pratique la laparotomie. Dans une cavité constituée par le duodénum et le mésentère on trouve 2 os de crâne fœtal et un os appartenant à un membre. Le fœtus âgé de 7 mois 1 2 était mort six mois avant l'opération.

Il ne restait aucune trace de placenta. La réaction essayée avec le sérum de la mère fut négative.

Abderhalden explique que c'est à cette disparition du placenta qu'il faut attribuer la cessation de la réaction positive trois semaines après l'accouchement dans les cas de grossesse normale.

II) Une femme non réglée depuis trois mois est prise brusquement de douleurs aiguës dans le côté droit ; en même temps, elle expulse d'abondants caillots. La femme, interrogée, dit n'avoir pas constaté la présence d'un œuf parmi ces caillots.

L'utérus semble normal, non agrandi, il mesure

7 centimètres et demi. On sent dans le flanc droit une tumeur dure, résistance; la réaction par la méthode de la dialyse est positive, on pose le diagnostic de grossesse extra-utérine avec hématocele.

On opère, on trouve sur le fond de l'utérus un myome sous-séreux. Les annexes sont normales. On énuclée le myome, mais on complète l'opération en enlevant l'utérus dont les parois très amincies constituent un danger en cas de grossesse ultérieure.

Sur le fond de l'utérus on découvre alors un polype jaune de 2 centimètres de long sur 1 centimètre de large, polype que l'examen microscopique révèle être un polype placentaire.

La réaction était positive parce que ces vestiges embryonnaires, appendus à l'utérus, continuaient leurs échanges avec la circulation maternelle.

III) Une femme qui depuis deux mois n'est plus réglée présente soudain les symptômes d'une hémorragie interne.

On estime qu'il s'agit d'une grossesse extra-utérine rompue. L'ouverture de l'abdomen donne issue à une grande quantité de sang frais. Les trompes semblent normale à l'inspection, la trompe gauche est cependant un peu congestionnée. On incise la trompe gauche, elle contient un œuf intact, fixé par un pôle entouré de villosités chorales, le tout de la dimension d'une pièce de 1 franc.

Il s'agit d'une grossesse tubaire pédiculée. Dans ce cas les franges chorales, étant donné leur position, n'ont pu être en rapport avec les vaisseaux de l'ostium utéri-

num non plus qu'avec la circulation péritonéale. Or le sérum de cette femme, placée dans le dialyseur avec du placenta normal, avait permis d'obtenir la réaction positive caractéristique.

Cette observation, fort intéressante au point de vue clinique (réaction positive dans la grossesse tubaire), l'est également au point de vue biologique. Comme nous l'avons signalé plus haut, on a voulu faire jouer un rôle aux franges du chorion dans la formation du ferment actif vis-à-vis du placenta ; dans le cas présent, les franges choriales étaient isolées et ne communiquaient en aucune façon avec la circulation matérielle... Il faut rapprocher cette constatation de celles faites de Schlimpert et Hissel (voir expériences dans la série animale), à savoir que le placenta de jument « qui ne possède pas de villosités choriales », permet néanmoins d'obtenir la réaction d'Abderhalden correctement.

Hiess et Lœderer examinent les sérums de 14 femmes soupçonnées de grossesses extra-utérines. Ils constatent 10 réactions positives, mais l'évolution ultérieure ne confirme que 4 grossesses extra-utérines.

Parsamow essaye 7 sérums de malades présentant des troubles utérins semblant caractériser des grossesses extra-utérines. Par la méthode de la dialyse, il trouve 6 réactions positives. Pour 4 cas le diagnostic fut presque immédiatement vérifié par l'intervention chirurgicale, les 3 autres cas demeurèrent soumis à l'expectation.

Dans 2 de ces cas la réaction répétée quelques jours

après fut cette fois toujours négative. Dans le troisième cas, on trouva, en opérant, un kyste de l'ovaire et pas de grossesse extra-utérine. On apprit alors que la malade avait avorté une semaine auparavant.

Behne cite, dans 4 cas de grossesses extra-utérines, vérifiées par l'intervention chirurgicale, 3 réactions positives. Ewler estime que dans ces conditions pathologiques la réaction est toujours positive sauf lorsqu'il s'agit d'une grossesse tubaire anciennement rompue, sans accidents graves commandant l'intervention immédiate, et lorsque le placenta a complètement disparu.

Porchownick conclut ainsi ses recherches : « La réaction d'Abderhalden sert non seulement au diagnostic de la grossesse normale, mais, ce qui est plus important, au diagnostic de la grossesse extra-utérine, bien qu'en général, dans ce cas, la réaction soit moins nette. »

Influence des divers états pathologiques

Les auteurs se sont non seulement proposé d'éprouver la valeur diagnostique de la réaction gravidique, mais encore de l'étudier chez des femmes non enceintes, atteintes de troubles utérins divers : tumeurs, infections, etc...

Schäfer signale que 25 sérums prélevés à des malades carcinomateuses ont réagi 10 fois positivement sur le placenta par la méthode de la dialyse, 17 de ces sérums examinés par le procédé optique ont donné, par contre, 10 résultats négatifs.

Dans 13 cas de myomes, cet auteur trouve 5 résultats positifs par la méthode de la dialyse, mais ne constate plus qu'un seul résultat positif, en contrôlant par la méthode optique.

Aschner ne relève aucune action positive sur le placenta en examinant 3 sérums pris à des malades atteintes de carcinomes, et 4 sérums prélevés dans des cas de myomes. Cependant, essayant 19 sérums prélevés chez des malades souffrant de tumeurs annexielles cet auteur a obtenu 2 fois des réactions positives. Les 2 sérums ayant été envoyés à l'Institut d'Abderhalden. Abderhalden et Schiff répétèrent chacun l'expérience, leurs résultats furent conformes à ceux d'Aschner. Cet auteur indique encore 3 réactions positives dans 3 cas de salpingo-ovarites.

Ecalte examinant à la clinique Tarnier les sérums de 27 femmes non enceintes conclut, qu'en dehors de la grossesse, l'appendicite, la salpingite, le kyste de l'ovaire, le fibrome, la bartholinite, peuvent faire apparaître des ferments susceptibles de donner avec le placenta des produits de dialysé fournissant des réactions colorées avec la ninhydrine.

Behne constate également que des femmes non enceintes souffrant d'une affection inflammatoire, surtout si elle est suppurée, de l'appareil génital ou d'une suppuration en un autre point du corps (mastites), donnent souvent une réaction positive.

Il ajoute que la technique actuelle ne permet pas de différencier d'une manière certaine la grossesse extra-utérine des affections annexielles inflammatoires sup-

purées ; et qu'il a vu des sérums de sujets mâles donner également des réactions positives avec le placenta dans des cas de tuberculose cavitaires et de maladies du foie.

Parsamow signale que des kystes de l'ovaire lui ont fourni des réactions positives.

Wimvorter conclut que sur 283 sérums de femmes examinés, non seulement les sérums de femme gravide lui ont fourni des résultats positifs, mais qu'il a obtenu des réactions analogues en employant les sérums de malades atteintes de carcinomes ou d'affections utérines inflammatoires. Selon lui le sérum des femmes présentant ces lésions réagit positivement sur le placenta dans 4/10 des cas.

Hiess et Lœderer ont constaté dix réactions positives, en examinant 31 sérums prélevés lors d'affections génitales.

Mais Porchownick constate ainsi que nous l'avons déjà dit que ces colorations obtenues avec des sérums de femmes fébricitantes sont tellement différentes de la coloration caractéristique de la grossesse, que la confusion est impossible.

Maccabruni enfin s'est attaché à étudier les modifications que peut faire subir à la réaction une affection intercurrente survenant lors de l'état gravide. Ses résultats sembleraient prouver que les infections n'ont aucun effet sur le sens de la réaction. Nous présentons enfin le tableau suivant de Tchudnonsky. Cet auteur prétend qu'en opérant avec toute la rigueur voulue, il n'a constaté que des résultats corrects :

GROSSESSE NORMALE A DIFFÉRENTS MOIS		GROSSESSE TUBAIRE		FEMMES NON ENCEINTES		HOMMES		PYOSALPINX		ENDOMÉTRITE	
Méthode optique	Dialyse	Méthode optique	Dialyse	Méthode optique	Dialyse	Méthode optique	Dialyse	Méthode optique	Dialyse	Méthode optique	Dialyse
Nombre des expér.		Nombre des expér.		Nombre des expér.		Nombre des expér.		Nombre des expér.		Nombre des expér.	
13 +	10 +	2 +	3 +	3 —	3 —	2 —	2 —	1 (1) + 4 —	5 —	5 —	5 —
Dont 6 cas ont été examinés par les 2 méthodes.		Dont 2 cas ont été examinés par les 2 méthodes.		Ces 3 cas ont été exa- minés par les 2 mé- thodes.		Ces 2 cas ont été exa- minés par les 2 mé- thodes.		Ces 5 cas ont été exa- minés par les 2 mé- thodes.		Ces 5 cas ont été exa- minés par les 2 mé- thodes.	

KYSTES DE L'OVAIRE		CARCINOME		HÉMATOME DE LA TROMPE		MÔLE HYDATIFORME		MYOME	
Méthode optique	Dialyse	Méthode optique	Dialyse	Méthode optique	Dialyse	Méthode optique	Dialyse	Méthode optique	Dialyse
Nombre des expériences		Nombre des expériences		Nombre des expériences		Nombre des expér.		Nombre des expér.	
1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —

1. L'auteur explique pourquoi un cas de pyosalpinx donna une réaction positive. Ce résultat contradictoire est dû à un accident survenu dans le procédé d'éclairage du polarimètre.

La réaction dans les cas d'éclampsie

Aschner examinant les sérums de huit femmes gravides éclamptiques trouve 8 réactions positives en faisant agir ces sérums sur des fragments de placenta provenant de femmes normales.

Jaworsky expérimentant dans les mêmes conditions conclut que le sérum des éclamptiques ne donne pas la réaction franchement colorée de la grossesse normale, mais une réaction bien plus faiblement positive.

Maccabruni remplace dans le dialyseur le sérum des éclamptiques par de l'urine et du liquide céphalo-rachidien d'éclamptiques. Ces corps demeurent sans action sur le placenta normal. Lichtenstein faisant agir sur le placenta éclamptique du liquide céphalo-rachidien éclamptique constate une décomposition de ce placenta. Il n'obtient, par contre, aucune réaction sur le placenta normal.

Henkel, d'autre part, avait constaté une faible décomposition du placenta normal par le liquide céphalo-rachidien éclamptique. Rubsamen enfin répétant les expériences de Lichtenstein n'obtient que des résultats négatifs. Il est donc impossible à l'heure actuelle de trancher cette question.

Lichtenstein utilise également le sérum des éclamptiques et trouve qu'il décompose fortement non seulement le placenta éclamptique, mais encore le placenta normal. Etudiant ensuite les effets sur des placentas

d'éclamiques des sérums de femmes gravides normales et de femmes gravides atteintes de néphrites banales, il obtient des réactions positives, mais d'intensité trop variable pour lui permettre une conclusion satisfaisante. Aschner constate, d'autre part que l'albumine urinaire des éclamiques donne la réaction colorée si on la met, dans le dialyseur, en présence de sérum de femme gravisée normale, mais cette albumine ne fournit aucune réaction si on fait agir sur elle le sérum d'une malade atteinte de néphrite banale.

Les résultats d'Aschner sont un argument de valeur pour confirmer l'origine sérique de l'éclampsie.

Les traitements récents de cette affection justifient d'ailleurs cette hypothèse.

Freund publie des guérisons d'éclampsie puerpérale par l'injection intraveineuse de sérum de cheval. Par ce même procédé il obtient également la guérison de vomissements incoercibles, accidents pathologiques dont la cause, aussi obscure que celle de l'éclampsie, peut être rapportée à une modification sérique.

En France, également, cette théorie humorale des accidents nerveux de la grossesse a encore été vérifiée par des résultats thérapeutiques.

Le Lorier rapporte le cas d'une femme de 23 ans qui fut prise au cours d'une seconde grossesse de vomissements incoercibles graves. Deux injections sous-cutanées de sérum de femme enceinte normale suffirent pour amener rapidement une tolérance gastrique parfaite.

Fieux et Dantin ont obtenu un succès analogue en pratiquant à quatre jours d'intervalle 2 injections hypo-

dermiques de sérum de femme gravide normale, chez une malade de 26 ans, présentant des vomissements incoercibles.

Viannay, à Saint-Etienne, pratiqua dans un cas analogue, la transfusion directe du sang d'une femme enceinte normale. Les vomissements cessèrent immédiatement, la malade engraisa en seize jours de 16 kilogrammes, mais la grossesse se termina par une fausse couche.

En Russie Parsamow ne constate pas de décomposition du placenta éclamptique par les sérums de femmes éclamptiques ; il trouve que ces sérums exercent une action très faible sur le placenta normal.

Epoque de l'apparition et de la disparition des ferments de défense

Les auteurs ont tenté de déterminer l'époque de l'apparition et de la disparition des ferments de défense dans le sang de la femme gravide.

Porchownick trouve qu'on peut obtenir la réaction positive caractéristique à une époque où aucun autre symptôme ne permet encore d'affirmer la gravidité. Il constate également la persistance de cette réaction, deux semaines après l'accouchement.

Judd constate que la réaction positive peut être obtenue dès la 7^e semaine de la gestation et se maintient constante du 7^e au 12^e jour après l'accouchement.

Lichtenstein examine les sérums de femmes récemment accouchées (8 jours après l'accouchement). Les

réactions qu'il obtient avec ces sérums sont également positives.

**Recherche de la réaction dans la grossesse
avec d'autres matériaux que le sérum et le placenta**

Nous avons déjà vu, à propos de l'éclampsie, que certains auteurs avaient remplacé, dans le dialyseur le sérum de femme gravide par du liquide céphalo-rachidien (Lichtenstein-Rubsamen, etc.), par de l'urine (Maccabruni).

F. Deutsch et R. Kœhler ont essayé la réaction en substituant au placenta des fragments de membrane déciduale. L'examen de 45 sérums, leur a fourni, dans ces conditions, seulement 10 réactions positives.

Au cours de 4 expériences Lichtenstein a employé, pour la dialyse en présence de placenta, le sérum obtenu en centrifugeant le sang provenant du cordon ombilical. La réaction fut chaque fois négative.

Cet auteur a également tenté de faire agir sur le placenta le liquide céphalo-rachidien de femmes gravides normales et de femmes non gravides. Ses résultats furent encore négatifs.

Il n'obtint pas plus de succès en utilisant le liquide amniotique et le liquide ascitique de femme non enceinte.

Kotchneff et Chingrewa ont essayé de remplacer dans le dialyseur les organes par du sang humain cuit jusqu'à ce que le liquide de cuisson ne donne plus aucune réaction avec la ninhydrine. Ces auteurs s'attendaient

à trouver une réaction positive avec le sérum humain, Abderhalden exigeant que les organes employés ne contiennent plus aucune trace de sang. Or le sang ainsi cuit fournit toujours une réaction négative en présence de sérums pris à divers individus.

Enfin en Amérique Marfield a tout récemment mis à dialyser les urines de femme gravide sans la présence d'aucun substratum.

Il a constaté que l'urine de femme gravide donne des produits de dialyse fournissant une réaction colorée avec la ninhydrine. Cette réaction apparaît à la fin du deuxième mois de la gravidité et son intensité augmente jusqu'au huitième mois.

Les urines continuent à donner ces produits dialysables pendant la semaine qui suit la délivrance. La réaction caractéristique disparaît vers le dixième mois après l'accouchement.

Existe-t-il une lactase dans le sang des femmes enceintes

On pouvait se demander s'il n'existait pas, dans le sérum des femmes gravides un autre ferment que le ferment protéolytique.

Schäfer, au cours de ses recherches, dit avoir trouvé dans ce sérum un ferment susceptible de dédoubler le lactose.

Falk expérimentant sur des femelles gravides d'animaux prétend également avoir mis en évidence un fer-

ment doué de cette même propriété. Abderhalden et Fodor n'admettent pas ces résultats.

Ils ont expérimenté sur 12 femmes enceintes dont les gravidités remontaient à différents âges. Ils n'ont presque jamais pu mettre en évidence le ferment dédoublant le lactose. Dans un seul cas de grossesse de neuf mois, ils ont obtenu un résultat positif.

Voici la technique employée : à 1 centimètre cube de sérum à examiner on ajoute 1 centimètre cube de lactose à 1 ou 2 ‰, dans du sérum physiologique.

On suit au polarimètre les variations du pouvoir rotatoire de la solution.

APPLICATION DE LA RÉACTION D'ABDERHALDEN AU DIAGNOSTIC DU CANCER

Les résultats du diagnostic biologique de la grossesse ont suscité par analogie des recherches tendant à appliquer la méthode d'Abderhalden au diagnostic du cancer.

Le sérum des malades atteints de carcinome doit digérer l'albumine de carcinome en donnant des produits de décomposition séparables par la dialyse et décelables par la réaction colorée. On prépare donc du tissu carcinomateux comme on prépare du placenta, mais au lieu de le couper en fragments, de le dépecer à la main, il est préférable de le hacher.

Le professeur Hermann Ludke a expérimenté avec des substances carcinomateuses provenant de squirrhe de la mamelle, de carcinome de la mamelle et de cancer du côlon. Les sérums essayés provenaient du sang d'individus normaux, de malades n'ayant jamais été soupçonnés d'affections cancéreuses et de malades atteints de cancers avérés. Il exécutait sur le dialysat la réaction du biuret.

Dans une première expérience, Ludke utilise des

fragments de carcinome du sein, de cancer de l'estomac, et d'une tumeur de souris implantée artificiellement. L'auteur emploie le sérum de 9 sujets : 2 sérums de femmes atteintes de tumeur du sein, 4 sérums d'individus atteints de cancer de l'estomac, 3 sérums recueillis chez des malades atteints respectivement de cancer de l'utérus, de cancer de l'intestin, de cancer du foie et de l'estomac.

Les expériences de contrôle sont réalisées en faisant agir sur les tissus carcinomateux des sérums de 4 individus sains et de malades souffrant d'affections diverses : érysipèle, typhus, scarlatine, tuberculose, oreillons, rougeole, diphtérie, etc.

Dans 8 cas les sérums des malades atteints de carcinomes fournirent 8 réactions positives. La réaction négative constatée eut lieu dans un cas où l'auteur avait ajouté le sérum pris à une malade ayant un carcinome du sein à des fragments hachés de carcinomes du sein.

En outre l'adjonction de sérum de malades atteints de cancers de l'estomac, ne produisit aucune décomposition du tissu de carcinome du sein.

Ludke a remarqué de plus que le tissu d'une tumeur de souris présente une réaction positive en présence de sérum de souris, mais que cette réaction devient négative si au tissu néoplasique de souris on ajoute du sérum provenant d'un carcinome humain.

Ludke se trouve donc ici en contradiction avec Ad. Fuschs lequel constate qu'il y a bien spécificité d'organes, mais ajoute qu'il n'y a point spécificité d'espèce,

à savoir qu'on peut faire agir le sérum d'un animal sur un organe originaire d'un autre animal et obtenir cependant des résultats positifs conformément aux données d'Abderhalden, et en contradiction avec Schlimpert cité plus haut, lequel conclut « que les ferments d'une espèce animale sont capables de décomposer également les placentas d'une autre espèce animale et qu'on peut remplacer dans le dialyseur le placenta de femme par du placenta de jument sans faire pour cela changer le sens de la réaction »...

Ludke ajoute enfin que les sérums de 4 individus normaux ne produisirent aucune réaction avec le tissu carcinomateux. Quant aux sérums prélevés chez les 26 malades non atteints de cancer, ils fournirent 4 réactions positives : 1 dans le cas de fièvre scarlatine, 1 dans un cas de dyspepsie nerveuse, 1 dans un cas de tuberculose et 1 au cours d'une cholécystite.

Ludke conclut de ses expériences que la méthode d'Abderhalden permet souvent d'obtenir une réaction positive (en faisant agir du sérum pris à des sujets carcinomateux, sur du tissu de carcinome), mais que cette réaction ne doit pas être considérée comme absolument spécifique.

Il rappelle que les sérums d'individus normaux, de femmes gravides par exemple, ont donné des réactions positives en présence du tissu carcinomateux.

Un grand nombre d'auteurs reprennent cette question. Gamboroff conclut que la réaction est nettement spécifique. Le tableau suivant indique les résultats obtenus par cet auteur :

NATURE DE LA MALADIE	NOMBRE DE CAS	RÉACTION	
		positive	négative
Sérum normal.....	40	0	10
Grossesse.....	22	22	0
Carcinome utérin.....	12	12	0
Sarcome de la lèvre supérieure.	2	2	0
Carcinome de la bouche.....	1	1	0
Carcinome de la lèvre inférieure	1	1	0
Epithéliome naso-labial.....	2	2	0
Carcinome du col utérin.....	1	1	0
Epithéliome du nez	2	2	0
Epithéliome naso-palpébral....	1	1	0
Carcinome de l'estomac.....	2	"	0
Carcinome de la langue.....	1	1	0
Carcinome de l'œsophage.....	2	"	0
Carcinome du larynx.....	2	2	0
Epithéliome fémoral.....	1	1	0
Sarcome de l'orbite.....	1	1	0
Fibro-sarcome du fémur.....	2	2	0
Sarcome de l'avant-bras.....	1	1	0
Sarcome du maxillaire.....	1	1	0
Sarcome syphilitique de la lèvre	2	1	0

Gamboroff constate que le sérum des sujets carcinomateux décompose les albumines du tissu carcinomateux, mais est sans action sur le tissu du sarcome. Il ajoute que réciproquement le sérum des malades porteurs de sarcome donne une réaction négative en présence du tissu

carcinomateux et que cette réaction devient positive si on remplace ce dernier tissu par des fragments de sarcome.

Markus confirme les assertions de Gaboroff. Il utilise la méthode de la dialyse pour différencier l'épithéliome du sarcome dans les cas de cancers de l'estomac, variétés de tumeurs que cet auteur étudie spécialement.

Félix Deutsch, et Robert Koelher, examinant les sérums de 10 femmes atteintes de carcinome, ont obtenu, en faisant agir ces sérums sur des fragments de placenta, 4 réactions positives et 6 réactions négatives ; en employant du tissu carcinomateux, ils ont constaté 10 réactions positives pour les 10 sérums carcinomateux essayés. Ces auteurs concluent également à la spécificité de la réaction.

Aschner semble lui aussi confirmer cette spécificité : 1 cas de fibromes utérins examinés en présence de fragments de carcinomes lui donnèrent 4 réactions négatives et les sérums de 14 épithéliomes utérins fournirent : 8 réactions nettement positives, 3 réactions faiblement colorées par la ninhydrine, mais négatives à l'examen polarimétrique, enfin 3 réactions faiblement positives, vérifiées par les 2 méthodes.

Cet auteur ayant également obtenu des réactions faiblement positives avec les sérums de femmes présentant des troubles de sécrétion ovarienne : 2 cas de métrite hémorragique à l'époque de la ménopause, 2 cas d'aménorrhée chez des jeunes filles chlorotiques, se demande s'il ne faut pas incriminer là quelques erreurs de techni-

que ou bien s'il s'agit de faits normaux encore inexpliqués.

D'autre part, certaines expériences positives par la méthode du dialyseur, ayant donné des résultats négatifs au polarimètre, Aschner propose de toujours contrôler les 2 procédés l'un par l'autre.

Enfin nous avons vu plus haut qu'Aschner n'obtint aucune réaction positive en faisant agir les sérums de femmes carcinomateuses sur des fragments de placenta.

Epstein pour 37 cas de carcinomes signale 36 réactions positives alors que les sérums de 47 individus non cancéreux lui fournirent 46 réactions négatives ; le sujet dont le sérum réagit positivement présentait un abcès du foie et des lésions de tuberculose pulmonaire.

Epstein avait également expérimenté sur 18 femmes enceintes dont 17 sérums fournirent des réactions positives avec du placenta et négatives avec du tissu de carcinome. Le cas négatif en présence du placenta est un avortement.

Epstein conclut que la réaction positive du cancer semble ne jamais apparaître dans la grossesse normale.

Léger Brockmann, étudiant particulièrement les cancers du tube digestif trouve, dans tous les cas de carcinome une réaction positive, et une réaction négative chaque fois qu'il emploie le sujet d'individus non carcinomateux.

Epicum insiste sur les précautions à prendre avant d'effectuer la réaction. « L'asepsie, dit-il, est d'une importance capitale si l'on veut obtenir des résultats sur lesquels on puisse baser un diagnostic certain. »

« La présence de microbes dans le sérum suffit pour
« provoquer dans son sein des phénomènes qui aboutis-
« sent à la dialyse des produits donnant la réaction po-
« sitive caractéristique. A plusieurs reprises, dans les
« dialyseurs en expérience préparés avec tous les soins
« d'aseptie désirables, et où nous n'avions pas intro-
« duit de tissu cancéreux, nous avons provoqué des
« réactions positives en introduisant dans le sérum un
« fil de platine chargé de streptocoques, staphyloco-
« ques, etc. »

Erpicum emploie comme réactif le biuret. Il a étudié la valeur de la réaction d'abord dans 42 cas de tumeurs, vérifiées plus tard anatomiquement.

Il y avait 33 cas de cancers comprenant : 18 cancers du sein, 6 de l'utérus, 4 de l'estomac, 6 du pancréas et du foie, 1 de l'œsophage, 1 de la jambe, 1 de l'intestin, 1 du cou, 1 sarcome de la cuisse. Parmi 9 cas cancéreux, 4 avaient été cliniquement diagnostiqués comme cancers, 2 diagnostics étaient hésitants. Par contre, parmi les cancers révélés par la réaction, pour 7 le diagnostic clinique n'avait pas été posé, pour les 2 autres le diagnostic était flottant.

L'auteur ajoute à ces observations un certain nombre d'autres qui furent conformes au diagnostic clinique : 51 observations avec 50 résultats exacts, ce qui donne une proportion de 98 % de résultats exacts. Il conclut que « la réaction d'Abderhalden a une valeur diagnos-
« tique indéniable, et surpasse de beaucoup en préci-
« sion toutes les autres séro-réactions du cancer ».

Se basant sur le travail d'Erpicum, Jean Benech

(Nancy) vient de publier en février 1914 un « essai sur la séro-réaction » d'Abderhalden, essai où il conclut à la spécificité exacte de la méthode.

A propos d'une femme présentant une tumeur symétrique des 2 seins on porta le diagnostic d'épithélioma. Une séro-réaction du sérum de cette malade sur des fragments d'épithélioma fut cependant négative.

Après ablation de la tumeur, on constata que ce néoplasme avait l'aspect d'un squirrhe du sein.

On prépara alors un fragment de cette tumeur et le mit en présence d'un sérum cancéreux, ayant donné précédemment une réaction positive avec un épithélioma. La réaction fut encore négative.

Or l'examen microscopique montra que la tumeur était d'origine sarcomateuse.

Les réactions avec le tissu épithéliomateux et le sérum épithéliomateux étaient donc conformes à la réalité.

L'auteur ajoute qu'il a, dans une autre série d'expériences, réussi à inactiver des sérums de malades atteints de cancer par chauffage à 58°.

Jonas semble moins affirmatif quant à la spécificité de la réaction. Dans 7 cas de carcinomes indiscutables, il compte seulement 5 réactions positives, et 2 négatives, sans que rien puisse expliquer cette divergence de résultats.

Schafer indique seulement 15 résultats positifs pour 21 carcinomes examinés. Brücke publie que les fragments d'une tumeur enlevée à une femme de 61 ans, n'ont pas été décomposés par le sérum d'une femme portant un carcinome certainement en activité, mais ont été forte-

ment attaqués par du sérum de femme gravide. La tumeur examinée histologiquement était un épithélioma du cordon.

Brücke conclut que les résultats positifs sont passibles de discussion, le sérum d'un néoplasme pouvant contenir d'autres ferments que celui soupçonné, ferments susceptibles de donner une réaction positive. Les résultats négatifs seuls échappent à la discussion dans les cas de tumeur.

Markus était d'avis opposé lorsqu'il constatait que de la réaction négative d'un sérum sur un tissu carcinomateux, il ne fallait cependant pas affirmer l'absence de carcinome chez le sujet.

Wimvorter, Hies et Lederer, constatent que le sérum de femmes atteintes de carcinome ou d'affections inflammatoires de l'utérus réagit positivement sur le placenta dans 4/10 des cas.

Ecalte signale également de son côté quelques réactions positives sur le placenta en employant le sérum de femmes non gravides, mais présentant des myomes, des fibromes, des épithéliomas utérins.

Nous avons vu, en terminant le chapitre sur la grossesse, que les carcinomes, les myomes, « blancs comme neige » peuvent cependant encore contenir du sang. « Le tissu carcinomateux bien préparé, ajoute Abderhalden, ne doit pas être décomposé par du sérum de femme gravide. »

Or F. Fränkel et F. Heimann disent qu'après avoir expérimenté avec toutes les précautions indiquées récemment par Abderhalden dans son troisième ouvrage :

Abwerfermente des tierhischen organismus, ils ont expérimenté avec les sérums de 10 femmes gravides et de 9 femmes carcinomateuses.

Ils ont trouvé de nouveau : que le sérum carcinomateux décompose faiblement, mais décompose encore le placenta et que le sérum des femmes gravides décompose le placenta et le carcinome, ce dernier cependant plus faiblement que le placenta.

Ils concluent à la non spécificité de la réaction dans le carcinome. Ils doutent de la spécificité du substratum et demandent si certaines protéines du foie, du muscle, etc. ne peuvent pas le remplacer.

Ils demandent enfin si la réaction du carcinome est positive dès le début de l'affection, avant même qu'aucun signe clinique ait révélé la présence de la tumeur.

Mais Abderhalden indiquant lui-même que certains placentas sont décomposés par des sérums de femmes carcinomateuses, les expériences ci-dessus ne prouvent pas l'impossibilité de préparer un placenta ou un carcinome donnant des réactions correctement spécifiques.

En février 1914, il ajoute que de nouvelles recherches lui ont démontré qu'il faut avoir grand soin, dans la préparation des organes cancéreux, d'enlever soigneusement toute la muqueuse.

APPLICATION DE LA RÉACTION D'ABDERHALDEN AU DIAGNOSTIC DES MALADIES NERVEUSES

Abderhalden, en 1912, avait constaté une réaction positive intense du sérum sur le placenta dans 2 cas d'éclampsie puerpérale, mais il n'avait pas poussé plus loin ses recherches, et, comme on l'a dit depuis, « lui-même alors n'insistait pas suffisamment sur ce fait important ».

Nous avons déjà vu précédemment comment après avoir vérifié la méthode de diagnostic normal de la grossesse, les auteurs avaient été amenés à étudier la pathologie de la grossesse et nous ne reviendrons pas ici sur les modalités de la névropathie gravidique : tétanie, vomissements incoercibles, éclampsie. Nous savons déjà que Lichtenstein, Aschner, Jaworsky ont étudié les réactions sériques dans ces cas. Nous ne ferons que rappeler les guérisons obtenues par Freund, Le Lorier, Fieux et Dantin, Viannay.

Les recherches se sont étendues, et nous allons voir comment les auteurs partant de ces données ont porté leurs investigations sur presque toutes les entités mor-

bides de la pathologie nerveuse ou glandulaire et de la psychiatrie.

Considérons maintenant, en détail, chaque affection. Parmi les troubles nerveux d'origine bien déterminée, vérifiée par la thérapeutique, les affections des glandes à sécrétion interne : thyroïde, ovaire, surrénales, dont la déficience ou l'hyperfonctionnement déversent dans le sérum des matériaux étrangers, devaient, dès le début, solliciter les expériences.

Les disthyroïdies, plus anciennement connues : goître endémique, myxoédème, maladie de Basedow ont été l'objet de toute une série de recherches. Les auteurs. Fauser le premier, ont essayé les sérums de ces malades en les mettant en présence, dans le dialyseur, de fragments de corps thyroïde ; puis, se basant sur la synergie fonctionnelle des glandes vasculaires entre elles, en présence de fragments d'ovaire, de testicule, de thymus.

En procédant ainsi Fauser constate que le sérum des Basedowiens, réagit positivement sur le corps thyroïde atteint de maladie de Basedow, alors qu'il ne produit aucune action sur le corps thyroïde normal. Nous verrons plus loin comment cet auteur, étudiant les réactions sériques des psychoses vis-à-vis des glandes à sécrétions internes, trouvera souvent des résultats tels que Munzer a écrit « Les travaux de Fauser et de ceux qui l'ont suivi permettent à présent d'employer, en psychiatrie, une thérapeutique opothérapique vraiment scientifique.

Bauer, continuant les recherches de Fauser, expérimente sur le goître endémique. Il obtient une réaction positive en employant des fragments de corps thyroïde

normal et du sérum de goitreux. Il remarque, en outre, que cette réaction demeure positive s'il remplace le sérum des goitreux, par le sérum d'individus sains, indemnes de toute lésion thyroïdienne en apparence, mais habitant une région où le goitre existe à l'état endémique.

Il constate également que si on fait ingérer de la thyroïdine à un sujet dont le sérum ne présente au paravant aucun pouvoir vis-à-vis de la glande thyroïde, ce sérum acquiert la faculté de décomposer la glande thyroïde, et de donner alors une réaction positive.

On peut interpréter ainsi ces résultats : entre 2 syndromes thyroïdiens nets, classés, ayant une symptomatologie bien définie, le myxœdème et la maladie de Basedow par exemple, peuvent se placer tous les cas d'hypofonctionnement ou d'hyperfonctionnement de la glande, dysthyroïdies susceptibles d'évoluer sans grands spectacles, dans certains cas révélées seulement par une trouvaille de laboratoire ou d'autopsie.

Les habitants d'une région où sévit le goitre endémique peuvent, à des degrés différents, être porteurs de lésions thyroïdiennes, fait qui explique certaines réactions positives de Bauer. Il semble que dans ces cas la réaction d'Abderhalden soit un témoin plus délicat que l'organisme lui-même, organisme capable de supporter sans troubles pathologiques appréciables des transformations humorales décelables seulement par le dialyseur.

Dans le tableau suivant Bauer expose les résultats de ses recherches. Il a noté soigneusement les troubles caractéristiques de chaque individu examiné par lui :

[illegible]

N°	SEXE		Age	Maladie	Thy- roïde	Goître col- loïde	Thy- mus	Hypo- physe	Ovaire	Testi- cule	Pan- créas	Surré- nales	Foie	Rein	Muscle	Sang (albumi- ne du)
	Hom- mes	Fem- mes														
24		f.	40 ans	Rhumatisme de Poncet.	—		+					+			+	—
25	h.	f.	53 —	Tumeur de l'hypophyse.	—	—		+		+			—	—		—
26		f.	49 —	Obèse.....	—			—				—	—			—
27		f.	21 —	Thyroïdectomie.....	—								—			—
28		f.	24 —	Goître.....	—								—			—
29		f.	24 —	Hystérie.....	—								—			—
30		f.	36 —	Goître.....	—								—			—
31	h.	f.	62 —	Néphrite chronique.....	—								—	+		—
32		f.	21 —	Néphr. subaiguë et goître.	—								—	+		—
33		f.	39 —	Ictère.....	—								—	—		—
34	h.	f.	20 —	Néphrite hémorragique..	—								—	—		—
35		f.	36 —	Goître.....	—								—	—		—
36		f.	41 —	Estomac en sablier.....	—								—	—		—
37		f.	45 —	Néphrite chronique.....	—								—	—		—
38		f.	20 —	Goître.....	—								—	—		—
39	h.	f.	26 —	Goître.....	—								—	—		—
40	h.	f.	36 —	Démence précoce.....	—								—	—		—
41	h.	f.	30 —	Démence Syphilis.....	—								—	—		—
42		f.	26 —	Tuberculose.....	—								—	—		—
43		f.	30 —	Urticaire.....	—								—	—		—
44		f.	35 —	Psoriasis.....	—								—	—		—
45		f.	36 —	Psoriasis.....	—								—	—		—
46	h.	f.	40 —	Alcoolisme.....	—								—	—		—
47	h	f.	28 —	Goître vasco-parench..	—								—	—		—
48		f.	20 —	Goître.....	—								—	—		—
49		f.	26 —	Hystérie.....	—								—	—		—
50		f.	24 —	Hystérie.....	—								—	—		—

Nous n'indiquons ici que les caractéristiques cliniques des malades atteints de troubles thyroïdiens. Pour les autres, les points essentiels de leur histoire seront exposés dans les chapitres traitant de leur affection principale.

1) Goitre crétinoïde. Diminution de l'ouïe, diminution de l'intelligence. Nystagmus.

2) Goitre. Intelligence modérée. Anémie.

3) Goitre diffus. Pigmentation brune du visage.

4) Goitre. Diminution de l'ouïe. Achylie.

5) Goitre.

6) Goitre, hystérie. Abondante pilosité pubienne.

7) Goitre crétinoïde.

8) Goitre parenchymateux comprimant légèrement la trachée. Matité du thymus.

9) Goitre parenchymateux. Nystagmus. Néphrite subaiguë. Anémie. Foie gras.

13) Goitre parenchymateux, polyarthrite rhumatismale, anémie grave, traces d'albumines.

14) Goitre. Léger tremblement. Matité du thymus. Sur 100 grammes de glucose ingérés 1 à 12 grammes rejetés.

16) Goitre parenchymateux. Règles irrégulières. Pigmentation brune de la peau. Glycosurie.

17) Goitre. Chlorose. Pas encore réglée. Faible pilosité axillaire et pubienne. Nervosisme.

20) Hystérectomie double à la suite d'un pyosalpinx. Goitre. Matité du thymus. Pilosité normale.

21) Goitre parenchymateux. Nystagmus, matité du

thymus. Pas de poils axillaires. Premières règles à 16 ans; irrégulières depuis.

27) Thyroïdectomie, neuf semaines avant la réaction. Règles depuis l'âge de 16 ans toujours faibles et irrégulières.

28) Goitre. Hystérie. Règles normales.

30) Goitre. Endocardite chronique. Anémie grave depuis deux ans. Epistaxis fréquentes depuis huit ans. Pas de matité du thymus. Premières règles à 12 ans toujours normales.

35) Goitre. Atrophie musculaire. Aucun symptôme d'intoxication thyroïdienne.

38) Goitre, nystagmus, hystérie.

39) Goitre.

47) Goitre. Intoxication thyroïdienne. Tachycardie. Tremblement, exophtalmie, glycosurie alimentaire.

49) Hystérie avec thyroïde légèrement augmentée.

On voit que Bauer a placé dans le dialyseur, avec les sérums des goitreux, non seulement des fragments de corps thyroïde, mais aussi du thymus, de l'hypophyse, de l'ovaire, du testicule, etc...

Lampé et Fuschs expérimentent à la fois sur le goitre endémique, sur le myxœdème et sur la maladie de Basedow.

	Nos des expériences	Glande thyroïde normale	Thy-roïde dans les ma-ladies de Base-dow	Ovaire	Thy-mus	Testi-cule
Maladie de Basedow	1.....	—	+	+	+	+
	1. Après traitement	+	—	—	+	»
	2.....	»	+	»	+	»
	3.....	»	+	+	+	»
	4.....	»	+	+	+	»
	5.....	—	+	+	+	—
	6. Après traitement	+	+	+	+	»
	7.....	»	+	+	+	»
	8.....	»	+	»	—	+
	9.....	+	+	—	—	»
	10.....	»	+	+	»	»
	11.....	+	»	»	+	»
	12.....	»	+	—	+	—
Maladie de Basedow fruste	13.....	+	+	+	+	—
	14.....	—	»	+	—	—
	15.....	»	+	+	—	—
	16.....	+	+	+	+	—
	17.....	+	+	+	+	»
	18.....	+	+	—	+	»
	19.....	+	+	—	—	—
	20.....	Aucune conclusion à en tirer, le sérum seul ayant suffi à donner la réaction				
	21 {	» de même de même	—	—	—	»
	22 { diagnostic					
	23 { incertain					
Myxoedème	24.....	+	+	»	»	»
	25.....	+	»	»	»	»
Goitre endémique	26.....	+	+	»	—	—
	27.....	+	—	—	—	»
	28.....	+	»	—	—	»
	29.....	+	—	»	»	»
	30.....	+	—	»	—	»
	31.....	+	—	»	+	—
	32.....	+	—	—	—	—
	33.....	+	—	—	»	»
	34.....	+	—	»	»	»
	35.....	—	+	—	+	—

	THYROIDE NORMALE		THYROIDE DES MALADIES DE BASEDOW		OVAIRE		THYMUS		TESTICULE	
	Nombre d'essais	Pourcentage de succès	Nombre d'essais	Pourcentage de succès	Nombre d'essais	Pourcentage de succès	Nombre d'essais	Pourcentage de succès	Nombre d'essais	Pourcentage de succès
		%		%		%		%		%
Maladie de Basedow	5	80	11	100	9	78	12	83	4	50
Maladie de Basedow fruste	6	83	5	100	5	80	6	66	4	0
Myxœdème	2	100	1	100	—	—	—	—	—	—
Goitre endémique	10	10	9	22	5	0	7	28	3	0

Devant ces résultats Lampé et Fuschs concluent que le sérum des Basedowiens agit toujours sur les glandes thyroïdes atteintes de maladie de Basedow et exceptionnellement sur les glandes thyroïdes normales. La dysthyroïdie provoque donc la sécrétion et le passage dans le sang de substances anormales. Ils remarquent également dans un grand nombre de cas, l'action positive du sérum des Basedowiens sur le thymus et sur les glandes génitales.

Chez les myxœdémateux, la réaction est positive avec la glande thyroïde normale seulement.

Dans le goître endémique, la réaction est toujours positive avec la glande thyroïde normale, sauf 1 cas (35).

Les troubles des myxœdémateux et des goitreux sont donc d'une espèce différente des troubles des Basedowiens puisqu'ils semblent n'avoir aucune action sur les glandes génitales.

Fausser s'adressant aux mêmes affections indique des réactions positives obtenues en faisant agir du sérum de Basedowiens sur des fragments de glande thyroïde atteinte de maladie de Basedow.

Mayer, Bundschuh, Hans Roemer, J. Fischer et Wegener qui ont répété ces expériences confirment les conclusions de Fausser.

Lampé et Papazolu constatent également l'action du sérum de malades basedowiennes sur l'ovaire. Ils obtiennent en effet 5 réactions positives dans ces conditions, pour 7 cas examinés.

Le tableau suivant indique les résultats de leurs expériences :

Numéros des expé- riences	Nature des maladies	Glande thyroïde normale	Glande dans maladie de Basedow	Ovaire	Foie	Testicule	Placenta	Thymus dans maladie de Basedow
1	Maladie de Basedow.....	+		+	—	—		
2	Mal. de Basedow et grossesse	+		+			+	
3	Maladie de Basedow. Tabès.	—	+	+				—
4	Maladie de Basedow.....	—	+	+				—
5	Maladie de Basedow.....	—	+	+				—
6	Maladie de Basedow.....	—		—				+
7	Maladie de Basedow.....	—	+	—				+

Nous constatons, d'après les travaux de Lampé et Fuschs, de Lampé et Papazolu, que le sérum de malades porteurs de lésions thyroïdiennes peut réagir positivement si on le place sur le dialyseur en présence de fragments de thymus.

Dans ces conditions, nous voyons que pour la maladie de Basedow on obtient 88 % de réactions positives, pour le Basedow frustre 68 %, et 28 % pour le goitre endémique. Par contre, on ne signale que des réactions négatives en employant du sérum de myxœdémateux.

Ces chiffres permettraient de supposer, dans certains cas pathologiques, une involution du thymus beaucoup plus longue que celle indiquée normalement. On pourrait même attribuer à cet organe un rôle dans des troubles de sécrétions internes, la maladie de Basedow, le goitre endémique (pour ne s'en rapporter qu'à l'expérimentation) troubles dans lesquels la glande thyroïde était seule incriminée.

Karl Kolb remarque que dans la plupart des morts survenant au cours d'opérations lors de maladie de Basedow, on a trouvé à l'autopsie le thymus hyperplasié.

Devant ces faits, il conclut que l'abstention chirurgicale doit être la règle, chaque fois qu'on soupçonne qu'une hyperplasie du thymus complique un goitre exophtalmique.

Or, la percussion, la radioscopie, ne suffisent pas toujours pour révéler la persistance du thymus. C'est pourquoi Kolb conseille de recourir à la réaction d'Abderhalden.

Kolb essaye de différencier ces 2 entités souvent confondues : la persistance du thymus et l'hyperplasie de cet organe.

Melchior, par exemple, dit-il, considère ces 2 phénomènes comme identiques. Or, il y a une importance capitale à délimiter nettement ces deux conceptions.

Le thymus persistant est un organe n'ayant pas suivi sa régression normale. Walder prétend d'ailleurs que cette régression n'est jamais parfaite ; même chez les sujets âgés on trouve un corpuscule rétro-graisseux appartenant au thymus. Le thymus persistant garde le poids et les dimensions qu'il présente au moment de sa plus grande activité : 25 grammes.

Dans l'hyperplasie, au contraire, le poids et les dimensions du thymus augmentent 40, 60, jusqu'à 80 grammes.

Rolleston signale chez un garçon de 6 ans un thymus de 310 grammes.

Kolb a vérifié que jamais le sérum d'individus normaux ne réagit dans le dialyseur sur des fragments de glande thyroïde normale et de thymus. Dans ces conditions Lampé et Papazolu ont obtenu les mêmes résultats négatifs.

D'autre part, avec des sérums d'individus jeunes, bien portants, chez lesquels le thymus était en régression, on a encore constaté l'absence de réaction de ces sérums, dans le dialyseur, en présence de fragments de thymus normal.

On peut donc vraisemblablement affirmer qu'un thy-

mus normal persistant fournit une réaction d'Abderhal-den négative.

Chez les Basedowiens l'hyperplasie du thymus est très fréquente. Kolb a examiné 19 Basedowiens dont 6 peu atteints et 13 présentant la symptomatologie complète du goître exophtalmique. Dans tous les cas où il y avait hyperplasie du thymus (confirmée soit par l'autopsie, soit par la radioscopie), la réaction du sérum avec le thymus fut toujours positive.

Le Dr Helen Deutsch, au cours de 36 expériences sur de jeunes sujets atteints d'affections diverses : épilepsie, hystérie, maladies de cœur, pneumonie, tuberculose (voir tableau page 86), et sur un enfant normal âgé de 16 ans, a toujours trouvé, sauf dans 2 cas, des réactions positives des sérums vis-à-vis du thymus.

Le tableau suivant détaille ces expériences :

N ^{os}	SEXE		Age	Maladie	Thy- mus	Thy- roïde	Ovaire	Tes- ti- cule	Sur- ré- nale	Hypo- physe	Sé- rum seul
	Hom- me	Fem- me									
1		f.	13 ans	Normal.....	+	—	—	—	+	—	—
2	h.		10 —	Epilepsie.....	+	—	—	—	+	—	—
3	h.		12 —	Maladie de cœur...	+	—	—	—	—	—	—
4	h.		7 —	Polyomyélite.....	+	—	—	—	+	—	—
5		f.	12 —	Epilepsie.....	+	—	—	—	+	—	—
6		f.	7 —	Emission nocturne d'urine.....	+	—	—	—	—	—	—
7		f.	12 —	Hystéro-épilepsie...	+	—	+	—	—	—	—
8		f.	12 —	Chorée.....	+	—	—	—	—	—	—
9		f.	9 —	Albuminurie.....	+	—	—	—	—	—	—
10	h.		8 —	Hystérie.....	+	+	—	+	—	—	—
11		f.	15 —	Tuberculose gan- glionnaire.....	+	—	—	—	—	—	—
12		f.	»	Tuberculose chro- nique.....	+	+	—	+	—	—	+
13	h.		6 —	Idiotie.....	+	+	—	—	—	—	—
14		f.	11 —	Maladie de cœur...	+	—	—	—	—	—	—
15		f.	7 —	Normale.....	+	—	—	—	—	—	—
16	h.		5 —	Normal.....	+	—	—	+	—	—	—
17	h.		9 —	Normal.....	+	—	—	+	+	—	—
18		f.	11 —	Albuminurie.....	+	—	—	+	—	—	—
19	h.		8 —	Chlorose. Léger goi- tre.....	+	+	—	—	—	—	—
20		f.	12 —	Maladie de cœur...	+	—	—	—	+	—	—
21		f.	9 1/2	Tuberculose pulmo- naire.....	+	+	—	+	+	—	—
22		f.	10 —	Pneumonie.....	+	+	+	+	+	—	—
23	h.		4 —	Fongus.....	—	—	—	—	—	—	—
24		f.	14 —	Tuberculose pulmo- naire.....	+	—	—	—	—	—	—
25		f.	12 —	Pneumonie.....	+	+	+	+	+	—	+
26		f.	»	Tuberculose os- seuse.....	+	—	+	—	—	—	—
27	h.		6 1/2	Spondylose.....	+	—	—	+	—	—	—
28		f.	6 —	Péritonite tubercu- leuse.....	+	—	—	—	—	—	—
29		f.	12 —	Epilepsie.....	+	—	—	—	—	—	—
30		f.	12 —	Chorée.....	+	—	—	—	—	—	—
31		f.	9 —	Albuminurie.....	+	—	—	—	—	—	—
32	h.		11 —	Déséquilibre moral. Onanisme.....	+	—	—	—	—	—	—
33		f.	13 —	Bronchiectasie. Lé- ger goitre.....	+	—	—	—	—	—	—
34	h.		10 —	Epilepsie.....	+	—	—	—	+	—	—
35	h.		12 —	Paralyse. Dystro- phie génitale. Ha- bitus féminin....	—	—	—	—	—	—	—
36		f.	5 —	Péritonite tubercu- leuse subfébrile...	+	—	—	+	—	—	—

Deutsch ajoute qu'elle a également trouvé 51 réactions positives sur le thymus, avec les sérums de 55 individus dont les âges varient de 17 à 70 ans, ne présentant aucune lésion organique appréciable.

Abderhalden lui-même s'est intéressé à la question des goîtres. Il annonce en décembre 1913 qu'il va publier les résultats obtenus en examinant les sérums de 30 malades atteints de goître exophtalmique et les sérums de malades paralytiques.

A côté de ces névroses dues à la lésion des glandes à peu près bien déterminées, nombre d'auteurs ont été tentés d'expérimenter la valeur de la réaction d'Abderhalden dans l'épilepsie, à propos de laquelle ont été tour à tour incriminés, entre autres causes, des viciations fonctionnelles des glandes sexuelles, du corps thyroïde, de l'hypophyse.

L'énorme influence sur l'épilepsie de la puberté, de la menstruation, de la gravidité, phénomènes retentissant immédiatement sur les glandes à sécrétion interne, semblent bien indiquer que dans certaines conditions anormales, ces organes déversent dans le sang des produits étrangers, nocifs, non assimilables sans troubles.

J. Fischer a pensé qu'il existait un ferment spécifique de l'épilepsie. Faisant agir du sérum d'épileptique sur des fragments de cerveau, il a trouvé quelques réactions positives. Mais il déclare qu'il n'a obtenu aucun résultat lui permettant de conclure.

Théobald a expérimenté sur 17 épileptiques : 13 hommes et 4 femmes. Il a placé leurs sérums dans le dia-

lyseur en présence de fragments de substance cérébrale corticale, de fragments d'ovaires et de testicules et de fragments de corps thyroïde. Il constate : 5 réactions nettement positives avec la substance cérébrale et 4 très faiblement positives.

Avec les glandes génitales 4 réactions positives et une réaction faiblement positive ; avec le corps thyroïde, une seule réaction positive et 2 réactions très faiblement positives.

Binswanger constate que le sérum de l'épileptique donne, avec du cerveau d'épileptique, dans 60 % des cas une réaction positive.

Urstein publie que ses expériences avec des fragments de cerveau épileptique confirment l'exactitude de la réaction, mais il insiste sur ce fait que le laboratoire ne doit pas faire négliger l'examen clinique du malade ; il conseille de dépister soigneusement chaque stigmate d'épilepsie et de ne pas s'en rapporter uniquement à une réaction positive ou négative.

Kafka faisant agir sur du cerveau du sérum pris chez un épileptique pendant la crise trouve une réaction positive. Ce même sérum agit également positivement sur la glande thyroïde et sur l'ovaire.

Mayer (voir tableau, page 95 et 96) publie dans un cas d'épilepsie une réaction positive avec la glande thyroïde, une réaction positive avec l'ovaire, et une réaction négative avec des fragments de substance cérébrale normale.

H. Deutsch (voir tableau, page 86) cite 3 cas d'épilepsie.

Chez le sujet 5, elle obtient 2 réactions positives : 1 avec le thymus, 1 avec les capsules surrénales. Chez le sujet 29, elle ne constate de réaction positive qu'avec le thymus. Le sérum du sujet 34 réagit positivement en présence de fragments de thymus et de capsules surrénales.

André Leri et Ch. Vurpas ont cherché les ferments destructeurs de l'albumine cérébrale dans le sérum de 25 épileptiques. Ils constatent 15 réactions positives et 10 réactions négatives, obtenant ainsi le même pourcentage que celui annoncé par Biswanger.

Il existe donc fréquemment des ferments anti-cerveaux dans les sérums des épileptiques.

Il est encore impossible de déterminer le rapport entre la présence de ces ferments et la proximité d'une crise ou la ténacité de l'affection.

Binswanger croyait que la réaction positive se maintenait toujours dans ce sens les jours qui suivent une crise (15 dans certains cas). Or les auteurs se sont assurés que la réaction est indépendante de toute crise.

Obregia et Pitulesco examinant 20 malades constatent : 6 fois une réaction positive de leurs sérums sur l'écorce cérébrale, 6 fois une réaction positive sur le corps thyroïde, et 4 fois seulement une réaction positive avec les glandes génitales.

Ils ajoutent qu'ils n'ont pas de « cas démonstratifs de la relation de causalité établie par Binswanger entre l'accès épileptique et la période intervalle d'une part, et la réaction positive ou négative de l'autre. »

Binswanger pensait également que, à distance d'une crise, la réaction était négative dans l'épilepsie « dyna-

mique » constitutionnelle, peu grave, et positive dans l'épilepsie organique grave.

Léri et Vurpas observent que les résultats de la réaction n'ont aucun rapport avec le nombre et l'intensité des crises, comme avec l'âge du malade, la date du début de l'ancienneté de la maladie. Les troubles mentaux semblent cependant plus fréquents dans les cas où la réaction est positive ; à ce point de vue la réaction aurait peut-être une valeur pronostique.

Il est encore impossible d'après ces auteurs d'affirmer la spécificité de la réaction.

Maintenant vont être abordées l'étude des paralysies, des névrites, des troubles mentaux imputables à la syphilis, des diverses formes de démence relevant de la psychiatrie.

Golla examinant 58 sérums pris à des sujets atteints de maladie du cerveau ou la moëlle trouve presque constamment une réaction positive dans la paralysie non seulement en plaçant dans le dialyseur des fragments de tissu cérébral, mais aussi d'autres organes : foie, reins, testicule, ovaire.

Mayer (voir tableau, page 95 et 96) a expérimenté sur 8 paralytiques. Il signale 8 réactions positives avec la substance cérébrale, 2 réactions positives avec le corps thyroïde normal, 4 avec le testicule, 3 avec le cerveau, 2 avec le foie de veau.

Ahrens étudiant les névrites, la syringomyélie, l'atrophie musculaire d'origine spinale, trouve des réactions positives avec des fragments de cerveau.

Otto Schültz conclut que ses recherches ne donnent

pas des résultats assez probants pour permettre des conclusions certaines.

Fausser et Schiff expérimentent sur la syphilis et les affections nerveuses parasymphilitiques. Ils utilisent des fragments de cerveau et du sérum de malades atteints de syphilis. Fausser obtient quelques résultats positifs dans la méningite syphilitique, le tabès, la paralysie générale et confirme ses résultats dans plusieurs notes.

Schiff tout en publiant quelques réactions positives semble peu affirmatif quant à la spécificité de la réaction.

Dans le même ordre de recherches il faut citer l'intéressante publication d'Obregia et de Pitulesco.

Ces auteurs examinent 24 cas de paralysie générale. Ces cas se répartissent en trois groupes.

1° Malades à la période d'état (15 malades). On essaye la réaction des sérums sur :

a) *Ecorce cérébrale* :

8 fois positive ;

5 fois faiblement positive ;

2 fois négative.

b) *Corps thyroïde* :

3 fois positive ;

7 fois faiblement positive

5 fois négative.

c) *Glandes génitales* :

4 fois positive ;

11 fois négative.

2° Malades dans l'état de marasme paralytique (5 malades). La réaction est inconstante avec l'écorce cérébrale. La réaction ayant été très faiblement positive 2 fois sur 5.

3° Malades dans un état stationnaire depuis des années (4 malades). La réaction avec l'écorce cérébrale est négative chez les 3 premiers et positive chez le dernier. Or dans les 4 premiers cas la réaction de Wassermann était également négative ; elle était positive dans le dernier cas. Les auteurs ont encore essayé dans ces cas les réactions du liquide céphalo-rachidien sur l'écorce cérébrale. Ils n'ont obtenu aucune réaction. Concentrant ensuite le liquide par distillation dans le vide au-dessous de 30 degrés, ils ont réduit son volume de 30 centimètres cubes à 6 centimètres cubes. Les résultats ont été également négatifs.

Enfin, faisant agir le liquide ainsi concentré sur des plexus choroïdes, les résultats de la dialyse ont été 3 fois faiblement positifs sur 5 cas. Le liquide céphalo-rachidien ne semble donc pas contenir de ferments de défense, ou s'ils existent, c'est en quantités très minimes.

Kafka examine des sujets dont 4 présentent des troubles graves, et un autre une méningite syphilitique. Il trouve une réaction positive dans ce dernier cas, en faisant agir le sérum sur la substance cérébrale ; il ajoute que pour les autres cas ses résultats ne peuvent être concluants, les psychoses présentées par les 4 syphilitiques semblant être distinctes de leur affection.

L'étude de la démence précoce fournit à Neue un tra-

vail fort intéressant. Cet auteur examine d'abord les sérums de 14 hommes présentant cette affection, 11 d'entre eux réagissent positivement avec le testicule, 2 réagissent sur le corps thyroïde. Ces 14 sérums placés dans le dialyseur en présence de substance cérébrale donnent 13 réactions positives ; la réaction négative est un cas de démence précoce non modifié depuis des années. Ce sérum donne d'ailleurs une réaction positive avec le corps thyroïde.

Chez 12 démentes précoces, 8 sérums réagissent positivement avec l'ovaire, 1 seul donne une réaction positive avec le corps thyroïde ; 2 réagissent à la fois sur l'ovaire et sur le thyroïde. Le dernier sérum seul ne donna aucune réaction.

L'auteur ajoute qu'il aurait désiré essayer sur l'ovaire les réactions du sérum des hommes et sur le testicule, les réactions sériques des femmes. Il n'a encore pu réaliser ce projet faute de matériel suffisant.

14 sérums de sujets atteints de démence paralytique fournissent sauf une exception (paralysie ancienne ayant débuté par une crise épileptiforme), des réactions positives en présence de fragments de substance cérébrale, de testicule, de foie, de pancréas et surtout de rein.

Par contre, de 7 malades atteints de paralysie progressive, un seul a fourni un sérum décomposant le cerveau.

Le sérum d'une femme atteinte de démence sénile décomposa des fragments d'ovaire, d'utérus, mais ne réagit pas vis-à-vis de thyroïde et de testicule.

Neue ajoute que les sérums de 9 individus sains de

20 à 25 ans ont décomposé les uns des fragments de foie, de thyroïde, les autres des fragments de rein, de pancréas, d'autres enfin ont agi sur la substance cérébrale.

Bauer (consulter tableau, page 75 et 76) ne trouve aucune réaction sérique dans les 2 cas de démence précoce examinés par lui : cas 40 et cas 41.

Kafka présente 70 cas. Il commence par expérimenter sur 17 individus normaux. Il place leurs sérums en présence de cerveau, de glandes à sécrétion interne, de foie, de rate, de prostate, de pancréas et ne constate que 2 réactions, encore sont-elles faiblement positives vis-à-vis de la rate.

Il examine ensuite 25 malades atteints de démence précoce. Il trouve la réaction d'Abderhalden positive en faisant agir ces sérums sur des fragments de cerveau. Il signale en plus un cas de réaction positive en employant des fragments de capsules surrénales.

Kafka rappelle enfin ses recherches dans 4 cas de manie dépressive, un cas d'acromégalie, un cas de maladie de Basedow, un cas de tumeur de l'hypophyse (réaction positive en faisant agir le sérum sur des fragments d'hypophyse) 1 cas d'idiotie, quelques paralysies et « maladies nerveuses douteuses ».

Mayer étudie la démence précoce, l'hébéphrénie, la stupeur, l'alcoolisme, la manie, la mélancolie. Les tableaux suivants indiquent les réactions sériques d'affection nerveuses classiques sur la substance cérébrale, le corps thyroïde normal, l'ovaire, le testicule, le foie les surrénales et même le testicule de cerveau.

Diagnostic	Sé- rum seul	Sub- stance céré- brale corti- cale	Thy- roïde nor- mal	Goi- tre	Testi- cule	Ovaire	Foie	Sur- ré- na- les	Testi- cule de tau- reau	Sub- stance céré- brale	Rein
Démence précoce Cas aigu	—		+		+						
Même cas, 2 sem. après.	—	+	—		+		—	—			
Même cas, 2 semaines plus tard.....	—	+	+		+				+		
Cas chronique.....	—		+		—	+					
Cas aigu.....	—		+			+		+			
Troubles de sécrétions glandulaires.....	—	—	+		—	+		+			
Hébéphrénie.....	—	+	+		+	—	—				
Stupeur.....	—	+	+		+						
Etat terminal.....	—	+	+		+						
Etat chronique.....	—	—	+		+						
Après plusieurs mois de stupeur.....	—	+	—		+		—		+		
Même cas, 8 jours plus tard.....	—	+	—		+		—				
Cas aigu.....	—	+	—		+	—					
Hébéphrénie.....	—	+	+		+		—				
Hébéphrénie.....	—	+	+		+		—	—	—		
Alcoolique avec syn- drome de Korsakow.	—		—		—		+		+		
Traumatisé avec syndr. Korsakow.....	—		—		—		—		—		
Hypomanie.....	—		—		—					—	
Manie	—		—		—					—	
Dépression.....	—		—		—		—			—	
Dépress. avec diabète.	—		—		—		+			—	
Mélancolie.....	—		—		—		—			—	
Mélancolie.....	—		—		—		—			—	—

Diagnostic	Sé- rum seul	Sub- stance céré- brale corti- cale	Thy- roïde nor- mal	Goi- tre	Testi- cule	Ovaire	Foie	Sur- ré- na- les	Testi- cule de veau	Sub- stance céré- brale	Rein	Cer- veau de veau	Foie de veau
Paralysie....	—				+					+			
Paralysie....	—						+			+		+	+
Paralysie....	—		+		+					+			
Paralysie....	—		—		—		+			+			
Paralysie....	—				+		—		—	+		+	—
Paralysie....	—						+			+			
Paralysie....	—		+		—		+			+			
Paralysie....	—		—		+		+			+		+	+
Syphilis cé- rébrale.....	—		—		—		+			+	—		
Alcoolisme..	—		—		—		—			—			
Alcoolisme..	—		—		—		—			—			
Psychopathie	—		—		—		—			—			
Psychopathie	—		—		—		—			—			
Paralysie agi- tante.....	—		—		—		—	+		—			
Encéphalo- malacie...	—		—		—					—			
Maladie de Basedow..	—		—		—	+	—	+		—			
Démence sé- nile.....	—		+	+	—		—	—		+			
Paranoïa....	—		—		—		—			—			
Maladie plu- riglandu- laire.....	—		—		—		—	—		—			
Epilepsie ...	—		+		+			—		—			
Démence pré- coce.....	—		—		—			—		—			

Hauptmann a trouvé que la réaction du sérum sur la substance cérébrale est toujours positive dans la démence précoce, mais que cette réaction varie de jour en jour dans la forme catatonique.

Hans Roemer, Wegener, Aschner accusent également des résultats positifs. Fauser conclut que la réaction sur la substance cérébrale semble toujours être positive dans la démence précoce, alors qu'elle est toujours négative dans les psychoses périodiques.

Fauser dès 1912 présentait les résultats de ses expériences dans 52 cas de démence précoce. En 1913, il publie 55 cas nouveaux.

Dans ses expériences Fauser trouve non seulement des réactions positives des sérums sur la substance cérébrale, mais encore sur les glandes génitales, les sérums de femmes réagissant sur l'ovaire, les sérums d'hommes sur le testicule. Fauser ajoute que, par contre, il n'a jamais vu les sérums de déments précoces hommes agir sur l'ovaire et réciproquement.

Fauser conclut en considérant la démence précoce comme une disjonction génitale et non thyroïdienne, les sérums essayés n'ayant presque jamais réagi sur les fragments du corps thyroïde.

Fauser se trouve ici en contradiction avec Bunsdchuh qui n'accuse jamais de réactions positives avec les glandes génitales, mais toujours avec le thyroïde.

Obrégia et Pitulesco publient des résultats qui permettent d'expliquer en partie cette divergence entre les deux auteurs. Ils constatent en effet que dans les cas récents de démence prédomine la réaction positive

du sérum avec les glandes génitales ; cette réaction est quelquefois fréquente avec le thyroïde, et rarement avec l'écorce cérébrale.

Dans les affections anciennes la proportion paraît s'inverser : on constate surtout des réactions positives avec l'écorce cérébrale et le thyroïde ; les résultats positifs deviennent très rares avec les glandes sexuelles. Les auteurs ajoutent qu'on ne peut tirer de ces faits une conclusion définitive. Le diagnostic différentiel de la démence précoce et d'autres maladies nerveuses seulement basé sur cette seule séro-réaction paraît encore hésitant mais reste un puissant adjuvant à côté des signes cliniques. Ces auteurs, dans une seconde publication, à propos des psychoses périodiques, constatent la spécificité des sérums de ces malades vis-à-vis du corps thyroïde des périodiques, comme chez les Basedowiens vis-à-vis du corps thyroïde de la même maladie. Cette spécificité vient à l'appui de l'opinion des auteurs qui admettent l'existence d'un rapport entre les psychoses périodiques et le corps thyroïde.

Bundschuh étudie les réactions du sérum des malades atteints de démence précoces vis-à-vis des fragments de cerveau, de glandes génitales, et de corps thyroïde. Le sérum dans ces cas, réagit, dit-il, toujours positivement avec le cerveau, et presque toujours avec le corps thyroïde. Il ne constate aucun effet sur les glandes génitales.

Dans la paralysie, Bundschuh constate la réaction positive du sérum sur la substance cérébrale, et sa réaction négative sur le testicule et le corps thyroïde.

Bayer constate dans 6 cas que les sérums de déments

précoces réagissent, sur le testicule et l'ovaire, en même temps que sur la substance cérébrale.

Dans la manie dépressive, il n'observe au contraire, aucune réaction sur ces organes.

Un cas de paralysie progressive lui fournit une réaction positive avec le cerveau.

Enfin, examinant le sérum d'une goitreuse gravide, il obtient une réaction positive avec le placenta et avec le corps thyroïde.

Théobald donne les résultats de ses expériences sur 58 malades « déments précoces », dont le début de l'affection remontait à des époques variant entre quatre mois et quarante-cinq ans.

Le sérum de ces sujets fournit :

1° En présence de fragments de substance cérébrale corticale :

21 réactions nettement positives, 19 réactions faiblement positives, les autres réactions, négatives.

2° En présence de glandes génitales :

22 réactions nettement positives, 8 réactions faiblement positives, les autres réactions, négatives.

3° En présence de fragments de corps thyroïde :

20 réactions positives, 7 réactions faiblement positives, les autres négatives.

Dans 2 cas seulement le sérum d'un même malade réagit positivement en même temps sur chacun de ces organes. Dans la manie dépressive Théobald, pour 10 sérums examinés, trouve une seule fois, avec un même sérum, une réaction positive avec la substance cérébrale, les glandes génitales, et le corps thyroïde.

Théobald s'est encore intéressé aux réactions sériques de la démence sénile (7 réactions positives avec le cerveau dans les 8 cas considérés, une réaction faiblement positive sur les glandes génitales) ; de l'alcoolisme (1 seule réaction positive avec la substance cérébrale corticale pour 10 sérums essayés), de la paralysie progressive, l'hystérie et l'idiotie.

Le sérum des idiots réagit plus fréquemment en présence des glandes génitales, qu'en présence du cerveau ou du corps thyroïde : 25 sujets examinés présentent : 10 réactions positives et 2 réactions faiblement positives au contact du testicule et de l'ovaire ; 6 réactions positives avec le cerveau, et 6 avec le corps thyroïde.

19 sérums pris dans la paralysie progressive réagissent positivement 9 fois avec le cerveau, et 2 fois très faiblement ; 1 seule réaction positive avec les glandes génitales.

Pour l'hystérie les résultats sont encore incertains. L'auteur indique que dans 3 cas, sur les 8 cas qu'il présente, le diagnostic d'hystérie était très incertain. Or ces 3 cas sont les seuls qui fournissent 3 réactions positives avec le cerveau et 3 réactions positives avec les glandes génitales. Deux d'entre eux réagissent encore positivement avec le corps thyroïde, ainsi que 2 des sérums pris aux 5 autres malades.

Zœdicke a obtenu des résultats positifs en faisant agir des sérums de Mongoliens sur des fragments de glandes génitales, de testicules ou d'ovaires.

Tout récemment enfin Babès et Pitulesco ont appliqué la séro-réaction d'Abderhalden à l'étude des ferments

de défense du sang chez les malades suivant le traitement anti-rabique.

Avant tout traitement, les auteurs se sont assurés que les sérums des malades ne contenaient pas de ferments spécifiques réagissant sur la substance nerveuse.

Le traitement une fois commencé, ils ont suivi chaque jour l'apparition des ferments. Ils ont constaté cette apparition dès le sixième jour, dans 11 cas ; et huit jours après le début du traitement dans les 4 autres cas.

Ils n'observent pas de modification de la réaction au cours du traitement. La réaction ne varie pas avec la quantité de substance injectée.

Babès et Pitulesco ont également étudié l'époque de la disparition de ces ferments. Ils constatent que ces derniers persistent tant que les nodules sous-cutanés au niveau des piqûres sont perceptibles, et ne disparaissent que lorsque le tissu est redevenu normal.

Dans un cas, ils constatent cette disparition dès le dixième jour après la dernière piqûre. Pour les 14 autres les ferments persistent deux ou trois semaines.

De plus le sérum de ces malades qui donne une réaction positive avec la substance nerveuse du lapin, ne la donne pas avec l'écorce cérébrale de l'homme, ou du moins rarement et dans ce cas faiblement positive.

En décembre 1913 Abderhalden remerciant ses collaborateurs cite avec éloges, parmi eux, ceux qui se sont adonnés à l'étude de l'application de sa réaction à la pathologie nerveuse : Binswanger, Wegener, Kafka, etc.

Il annonça que lui-même s'intéresse aux réactions sériques des dysfonctions thyroïdiennes et qu'il allait publier une série de résultats.

APPLICATION DE LA RÉACTION D'ABDERHALDEN AU DIAGNOSTIC DE LA TUBERCULOSE

En juillet 1913 Abderhalden appliqua sa méthode au diagnostic de la tuberculose. Il parvint à des résultats intéressants à la fois par la méthode optique et au moyen du dialyseur.

Dans le premier procédé Abderhalden emploie une peptone extraite de corps bacillaires et l'introduit avec le sérum à examiner dans le tube d'un polarimètre. Le tube est maintenu à une température constante, et, si le sujet qui a fourni le sérum est bacillaire, on note une déviation atteignant jusqu'à 20 centièmes de degrés.

Dans le second procédé, Abderhalden place sur le dialyseur un fragment de poumon atteint de pneumonie caséeuse et constate que le sérum tuberculeux dédouble cette matière caséeuse.

Des sérums de chiens et de lapins, préalablement inoculés, lui donnèrent 15 réactions concordantes. Il ajoute qu'il peut également déterminer avec certitude la tuberculose bovine vulgaire ; dans la tuberculose miliaire, au

début, les résultats sont moins nets : l'épreuve est négative une fois sur cinq.

Ewler puplie à la même époque 10 résultats positifs confirmés depuis par l'évolution clinique.

E. Franckel et F. Gumpertz placent sur le dialyseur soit du parenchyme pulmonaire bacillaire, soit une bouillie de substances bacillaires.

Les sérums de 16 tuberculeux avérés fournirent 12 réactions positives.

Examinant ensuite des malades suspects (25 malades), ils ne constatent qu'une seule réaction positive. Par contre les sérums de 47 sujets, indemnes en apparence de toute lésion tuberculeuses présentèrent 16 réactions très positives et 3 réactions faiblement positives (dans ces 3 derniers cas le sérum des malades donnait également la réaction d'Abderhalden positive).

Enfin, 2 sérums de lupiques, sur 6 examinés, réagirent deux fois positivement sur le parenchyme pulmonaire bacillaire ; la réaction fut également positive avec le même substratum dans un cas d'exsudat pleural, et dans un cas de cystite tuberculeuse.

Lampé a repris les travaux d'Abderhalden. Il a commencé par étudier la tuberculose chez les bovidés et a toujours trouvé des réactions positives en faisant agir le sérum de bœufs tuberculeux sur du parenchyme pulmonaire caséeux. En septembre 1913, il a publié des résultats très nets lorsqu'il s'agit de tuberculoses avancées, mais encore discutables dans les cas de tuberculose au début.

Nous avons vu plus haut que Bauer avec été conduit,

incidemment, à étudier les réactions sériques de quelques tuberculeux.

Cet auteur s'attache à déterminer la valeur de ces réactions sur le corps thyroïde, l'ovaire, etc. Mais il n'a jamais utilisé comme substratum des substances bacillaires. Il cite :

a) *Cas 15.* — Femme de 19 ans, atteinte de tuberculose cavi-taire. Le corps thyroïde n'est pas augmenté de volume, on constate une zone de matité correspondant au thymus. Les bras et la poitrine sont fortement pigmentés en brun. Le sérum de cette malade agit positivement sur le corps thyroïde, le thymus, le pancréas.

b) *Cas 23.* — Homme de 67 ans, atteint de phtisie sénile. Ce malade est dans un état de cachexie avancée. On remarque que tout le corps est pigmenté en brun. Le sérum réagit positivement avec le thymus, les capsules surrénales, les fragments de muscle.

c) *Cas 24.* — Femme de 40 ans, présentant un rhumatisme tuberculeux de Poncet. Le sérum agit positivement sur du goitre colloïde, on constate une très légère action sur les glandes sur-rénales,

d) *Cas 42.* — Femme de 26 ans, tuberculeuse pulmonaire. La rate de cette malade est considérablement augmentée de volume.

Le sérum reste inactif vis-à-vis de l'ovaire, du corps thyroïde, des capsules surrénales, etc.

Dans le même ordre d'idée Neue a également étudié les réactions sériques de 2 sujets atteints de maladie

bronzée sur les fragments de capsules surrénales. Il a constaté 2 réactions positives sur des capsules surrénales normales. L'auteur n'a pas essayé la réaction sur des capsules surrénales bacillaires.

En octobre 1913, Jessen indique, sous toutes réserves que les cas fermés de tuberculose pulmonaire semblent réagir très positivement sur un substratum de peptones de bacilles et de cultures de bacilles tuberculeux, lorsque ces cas sont cliniquement favorables. Les cachexies tuberculeuses donneraient selon lui, dans ces conditions, une réaction négative.

Il signale d'ailleurs que, dans un cas de cachexie, la réaction d'abord négative devient positive après quelques temps de traitement intensif et l'ouverture d'un pneumothorax artificiel.

Ces résultats sont contestés par Pinkusson.

Enfin R.-S. Krim, dans une communication récente semble conclure que la réaction ne peut être considérée comme spécifique pour la tuberculose, beaucoup de sérums pris à des sujets sains réagissant positivement en présence des substratums tuberculeux.

Les discussions n'attaquent en rien l'exactitude du principe de la méthode d'Abderhalden. Son application au diagnostic de la tuberculose est souhaitable, préférable selon le mot de Lampé à la réaction de Von Pirquet, en ce sens que par ce procédé « aucun poison n'est introduit dans l'organisme ».

APPLICATION DE LA RÉACTION D'ABDER- HALDEN, AU DIAGNOSTIC DES DERMATO- SES, DES LÉSIONS RÉNALES, DES LÉSIONS HÉPATIQUES, DES LÉSIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF ET DE LA SCARLATINE.

La séro-réaction dans les dermatoses

La mise en évidence dans le sérum de femmes graves d'un ferment tendant à désagréger les éléments albuminoïdes du placenta, devait, entre autres recherches, amener les auteurs à examiner les réactions sériques des dermatoses : car la grossesse elle-même peut se compliquer d'une dermite polymorphe récidivante, d'érythèmes, de prurits.

Il a semblé d'ailleurs possible de considérer la peau comme un dialyseur et le sérum sanguin comme la solution dialysable. Cette solution, sous des influences pathologiques, serait susceptible de « se surcharger de produits à éliminer » et certaines réactions cutanées, prurits, eczémas amicrobiens, psoriasis pourraient alors s'expliquer par la présence dans le courant circulatoire de produits jouant le rôle de véritables corps étrangers capables de troubler la fonction normale du dialyseur.
(A. Leroy.)

En 1910 Mayer et Linser ont constaté la guérison de la dermatose polymorphe, récidivante, de la gestation « herpes gestationis », sous l'influence d'injection de sérums de femmes gravides normales.

Freund rapporte également un cas de toxémie gravidique grave, où tous les phénomènes : vomissements, ictère, albuminurie, « prurigo », disparurent à la suite de 2 injections intra-veineuses de sérums de femmes gravides saines.

Quoique Mayer et Linser n'aient pas tenté d'interpréter leurs résultats, il nous semble possible d'admettre que l'injection d'albumines étrangère ait agi en provoquant ou en augmentant la formation de ferments de défense actifs vis-à-vis de produits albuminoïdiques toxiques, générateurs des accidents constatés.

Rubsamen publie d'ailleurs un cas de « prurit gestationis » dans lequel il effectua la réaction d'Abderhalden avant et après injection de sérum de femme gravide normale. Il remarque que la réaction était beaucoup plus intense avant cette injection.

Nous avons déjà vu Lampé et Fuschs conclure que la dysthyroïdie provoque la sécrétion et le passage dans le sang de substances anormales. Or il y a une théorie thyroïdienne du psoriasis, théorie à l'appui de laquelle on rapporte l'autopsie d'un psoriasique faite par Sergent (thèse de Ménard), autopsie où on ne peut relever d'autre lésion qu'une atrophie du corps thyroïde.

Bauer (voir tableau, page 75 et 76) a essayé de vérifier cette hypothèse en utilisant la méthode d'Abderhalden.

Il a expérimenté dans 3 cas de psoriasis et dans 1 cas d'urticaire.

a) Le premier malade examiné (cas 13) est un homme de 55 ans atteint de pellagre et de psoriasis. Vigoureux, ce sujet ne présente aucun symptôme thyroïdien. L'auteur note une coloration rougeâtre de la peau.

Le sérum réagit positivement en présence de glande thyroïde normale et de capsules surrénales.

b) Dans le second cas (44) il s'agit d'une femme de 35 ans, sans lésions thyroïdiennes appréciables. Bauer n'obtient aucune réaction positive.

c) Le dernier cas (45), psoriasis chez une femme de 36 ans, ne donne aucune réaction.

d) Le sérum d'une femme de 30 ans (cas 43) atteinte d'urticaire nerveux, reste également sans action sur la glande thyroïde, l'ovaire, la substance cérébrale, etc...

Reines a étudié la sclérodermie généralisée. Il a remplacé le placenta par du corps thyroïde, de l'hypophyse, des capsules surrénales et des ganglions mésentériques.

Dans 3 cas examinés à cet égard la réaction fut positive avec le corps thyroïde et les ganglions mésentériques, dans 1 cas elle fut positive avec les capsules surrénales.

La réaction fut toujours négative avec l'hypophyse et le pancréas.

En France, Léri, reprenant ces expériences, n'a trouvé que des réactions négatives dans la sclérodermie.

La séro-réaction dans le diabète et les néphrites

Lampé et Papazolu ont expérimenté sur 10 sérums pris dans 10 cas de diabète et de néphrites. Mais ces auteurs ayant placé, dans le dialyseur, les sérums en présence d'organes normaux n'ont obtenu que des réactions négatives.

Lichtenstein a étudié les réactions sériques des femmes gravides normales, et des femmes atteintes de néphrites banales, sur des placentas éclamptiques. Il constate des réactions positives, mais d'intensité trop variable pour lui permettre une conclusion satisfaisante.

Aschner indique que l'albumine urinaire des éclamptique est décomposée par le sérum de femme gravide normale (réaction positive), alors que le sérum de malade atteinte de néphrite demeure sans action sur cette albumine.

Bauer (tableau, page 75 et 76) examine successivement :

a) *Cas 9.* — Une femme de 18 ans présentant un goitre parenchymateux, est atteinte de néphrite subaigüe, avec anémie, foie gras.

Son sérum réagit positivement avec la glande thyroïde, le foie, le rein, l'albumine du sang normal.

b) *Cas 31.* — Homme de 62 ans. Néphrite chronique avec hypertension, insuffisance cardiaque, foie cardiaque.

Le sérum décompose le foie, les capsules surrénales et le rein.

c) *Cas 32.* — Femme de 21 ans atteinte de néphrite subaiguë avec œdèmes légers (on a trouvé des ascaris dans les matières fécales). Le sérum donne une seule réaction positive avec le foie.

d) *Cas 34.* — Homme de 20 ans. Néphrite hémorragique aiguë depuis trois semaines, anémie. Le sérum donne une réaction positive avec l'albumine du sang ; une réaction faiblement positive avec le rein.

e) *Cas 37.* — Néphrite chronique chez une femme de 45 ans avec anémie pernicieuse. Une seule réaction positive avec l'albumine du sang.

Bauer a également expérimenté dans des cas d'artério-sclérose :

Cas 10. — Femme de 60 ans. Néphrite chronique, artério-sclérose, insuffisance cardiaque, stase hépatique. Le sérum réagit positivement sur la glande thyroïde, et très faiblement sur le foie et le rein. •

Cas 19. — Femme de 68 ans. Artério-sclérose, dégénérescence du muscle cardiaque. Hystérie. Le sérum réagit positivement sur le goitre colloïde, sur le thymus, et sur le foie.

Neue, étudiant à un autre point de vue l'artério-sclérose et les néphrites chroniques, a constaté que les sérums de 7 malades présentant cette affection lui ont fourni 4 réactions positives sur des fragments de cerveau, 3 réactions positives avec la prostate, et 4 réactions positives avec le testicule.

Le sérum d'une femme atteinte d'artério-sclérose réagit positivement sur le cerveau, l'ovaire, les trompes, et négativement avec le thyroïde et le testicule.

Neue ne signale aucune expérience avec du rein.

Félix Deutsch et Robert Köhler publiant les réactions sériques de 22 cas de néphrite, constatent 17 réactions positives avec le rein.

Dans cet ordre d'idées le travail de M. Kotchneff et A. Chingrewa est fort intéressant.

Ces auteurs ont constaté, dans les néphrites, non seulement une réaction positive des sérums sur le rein, mais encore une réaction des sérums avec le cœur et avec le placenta, cette seconde réaction souvent même plus intense que celle obtenue avec le rein.

Le rapport des protéides du placenta et des ferments de défense du sérum des néphritiques est peu net, à moins que certains ferments ne puissent se rencontrer dans le sang des femmes enceintes aussi bien que dans le sang des néphritiques.

La fréquence des néphrites chez la femme gravide ne pourrait-elle trouver en cela une explication nouvelle ?

Les auteurs concluent que dans ces conditions « la « séro-réaction de la grossesse ne pourrait être comptée « comme absolue si les sérums de femmes non gravides, « mais atteintes de néphrites donnaient la même réaction ». ».

La séro-réaction dans les maladies du foie

Peu d'auteurs jusqu'ici ont expérimenté sur le foie et Abderhalden ne semble pas disposé à s'engager dans cette voie.

Breitmann a cependant tenté de déterminer s'il existe

une différence entre les lobes gauches et droits du foie au point de vue qui nous occupe.

Il expérimente sur des foies cardiaques, sur des foies lithiasiques, dans des cas de colites graves. Il note que dans ces cas, les sérums des malades donnent beaucoup plus de résultats positifs lorsqu'on les fait agir sur des fragments de lobes droits, que mis en présence de fragments de lobes gauches.

Tout récemment Hertz et Brockmann publient leurs observations dans trois cas de cirrhoses, deux cas de cancers, un cas d'hépatosplénomégalie, des foies cardiaques. Les résultats sont positifs pour les cirrhoses et les cancers, négatifs dans les autres affections. Un des résultats fournis par ces auteurs est intéressant. Il s'agit d'un sujet, tuberculeux pulmonaire avéré, dont le sérum donnait une réaction positive en présence du foie, alors qu'il restait inactif vis-à-vis de parenchyme pulmonaire tuberculeux. On peut rapprocher de ce fait une autopsie de Gaucher et Sergent au cours de laquelle on trouva, chez un malade qui ne présentait aucun signe clinique de lésion hépatique, une quantité de petits nodules tuberculeux, très discrets, disséminés dans le foie.

Le malade signalé par Hertz et Brockmann réagissait peut-être positivement pour une raison analogue.

Bauer (voir tableau, page 75 et 76) a trouvé (cas 18) chez un goitreux présentant une syphilis du foie une réaction positive sur du foie normal. Chez une femme ictérique (cas 33), le sérum ictérique réagit seulement sur le foie (réaction positive).

Dans un cas de dépression avec diabète, Mayer (tableau

page 95) signale également une réaction positive avec le foie.

En France, Fiessinger a examiné les sérums de malades ictériques. Il a expérimenté sur deux ictères chroniques par rétention dus, le premier à une lithiasé du canal cholédoque. le second à un cancer du pancréas. Aucun d'eux ne présentait les symptômes d'une insuffisance hépatique grave.

Le sérum de ces malades resta sans action sur des fragments de tissu hépatique.

Dans un autre ictère, chez un alcoolique non cirrhotique, avec hémorragies et troubles nerveux, présentant à l'autopsie une dégénérescence graisseuse du foie, Fiessinger a obtenu les résultats suivants :

Sérum + Albumine de foie humain	=	réaction à la ninhydrine	+
— + — de rein humain	=	—	+

Trois jours après :

Sérum + Albumine de foie humain	=	réaction à la ninhydrine	+
— + — rein humain	=	—	+
— + capsules surrénales	=	—	+
— glande thyroïde	=	—	+
— ovalbumine	=	—	—

La séro-réaction dans les maladies de l'estomac

Nous avons cité plus haut les travaux sur les vomissements incoercibles de la grossesse mais il ne s'agissait pas dans ces cas d'affections déterminées du tube

digestif comme dans les expériences où Kabanow examinait les sérums de malades atteints d'ulcère de l'estomac et d'ulcère du duodénum.

Kabanow différencie ces deux affections l'une de l'autre en faisant dialyser avec le sérum suspect des fragments d'estomac ou de duodénum.

Dans le cas d'ulcère de l'estomac la réaction est positive en plaçant le sérum avec des fragments d'estomac, et négative si on le fait agir sur des fragments de duodénum. De même le sérum, au cours de l'ulcère du duodénum ne réagit jamais en présence de fragments d'estomac. Kabanow a également constaté, dans quatre cas d'anémie pernicieuse, trois réactions positives du sérum sur les fragments d'intestin, et une réaction positive sur les fragments d'estomac.

Bauer dans un cas d'achylie gastrique (cas 12, tableau, page 75), achylie accompagnée de glycosurie, coloration bronzée des téguments, névropathie grave, chez un homme de 35 ans, constate une réaction légèrement positive sur le corps thyroïde, et nettement positive sur le pancréas, le foie et les capsules surrénales.

Le sérum d'une femme de 41 ans, très maigre, dont l'estomac affecte la forme dite « en sablier » (cas 36) ne fournit une réaction positive qu'en présence du tissu musculaire.

Bauer étudiant également les « parasites intestinaux » constate que le sérum d'un sujet porteur de *tœnia* ne réagit pas sur l'albumine coagulée du *tœnia*.

M. Rubinstein et A. Julien ont obtenu dans une infection à *ascaris* du cheval, une réaction positive en

faisant agir le sérum du cheval sur l'albumine de l'ascaris.

En Russie (janvier 1914) N. Kotchneff et A. Chingrewa ont constaté que les sérums des malades atteints d'helminthiase réagissaient positivement avec l'albumine des helminthes, avec l'albumine de toutes les espèces de tœnias, et même avec l'albumine de l'ascaris des chevaux.

La séro-réaction dans la scarlatine

L'infection scarlatineuse provoquant des lésions particulièrement graves des ganglions lymphatiques axillaires et mésentériques, W. Schultz et L. Grote ont étudié, dans cette maladie, la valeur de la réaction d'Abderhalden.

Ils ont obtenu une réaction positive en mettant en présence de ganglions axillaires et mésentériques normaux, le sérum de malades scarlatineux.

Les auteurs partent de ce principe que les albumines échappées aux ganglions sont dédoublées en molécules plus petites par un ferment spécifique ; ce ferment apparaît dans le sang des malades à partir du 6^e jour et s'y maintient jusqu'au 31^e jour.

Les auteurs ont expérimenté sur 24 malades. Conformément à leurs données théoriques la réaction n'est jamais positive avant le 6^e jour de la maladie.

Dans 2 cas seulement cette réaction positive a cessé avant le 31^e jour : dans le 1^{er} cas il n'y eut plus de réac-

tion à partir du 16^e jour ; dans le 2^e cas la réaction cessa au 18^e jour. Toutes les autres expériences furent conformes aux prévisions de Schlutz et Grote.

Enfin en février 1914, Wœlkel propose l'emploi de la méthode d'Abderhalden pour le diagnostic de la typhoïde, de la diphtérie, de la trypanosomiase.

LA RÉACTION D'ABDERHALDEN DANS LA SÉRIE ANIMALE EXPÉRIENCES PERSONNELLES

Il était intéressant de voir si la réaction d'Abderhalden était une propriété spécifique de l'espèce humaine, et de déterminer en même temps si les ferments de défense d'une espèce animale étaient actifs uniquement vis-à-vis de cette espèce.

Les recherches ont été poursuivies dans des sens différents. Nous avons déjà vu que Meyer, étudiant les réactions sériques de sujets atteints de maladies mentales avait placé, dans le dialyseur, leurs sérums en présence de divers organes animaux : testicules de taureau, foie de veau, etc... (Voir tableau, page 95 et 96).

Dans 3 cas de paralysie, tous les résultats ont été positifs, aussi bien avec le cerveau de veau qu'avec le cerveau humain. On note la même concordance avec le foie.

Par contre, le testicule de veau ne fournit aucune réaction, alors que le testicule d'homme était décomposé par le sérum.

Les sérums prélevés au cours de deux démences pré-

coces donnent deux réactions positives avec le testicule de taureau et le testicule d'homme.

Dans un cas d'alcoolisme, nouvelle divergence, la réaction est positive avec le testicule de taureau, et négative avec le testicule d'homme.

Hegener avait, d'autre part, constaté que dans les affections de l'œil, le sérum du malade décompose non seulement l'uvée de l'homme, mais aussi l'uvée de porc.

Fuschs, expérimentant dans le même sens, examine dans une première série d'expériences, les sérums de sept malades atteints de manie dépressive. Il trouve une concordance de résultats négatifs en faisant agir les sérums sur les testicules d'hommes et de taureaux et sur des ovaires de femmes et de vaches.

Une seconde série d'expériences met en présence des mêmes organes les sérums de 12 déments précoces. Fuschs relate cette fois :

1° 3 réactions positives à la fois sur le testicule d'homme et sur le testicule de taureau ;

2° 3 réactions positives à la fois sur l'ovaire de femme et sur l'ovaire de vache.

On pouvait également tenter de faire apparaître des ferments de défense chez un animal, en lui injectant des triturations d'organes prélevés sur un animal d'une autre espèce. C'est ainsi que Fusch a été amené à injecter à des lapins des triturations de testicule d'homme et de testicule de taureau, et à éprouver les sérums de ces lapins vis-à-vis des mêmes organes qu'il leur avait injectés.

Il constate ainsi :

1° Le sérum d'un lapin réagit positivement vis-à-vis du testicule d'homme (après injection d'une trituration de testicule humain).

2° Le sérum d'un lapin réagit positivement vis-à-vis du testicule de taureau (après injection d'une trituration de testicule de taureau).

Hirsch se plaçant au même point de vue a injecté à des animaux mâles, lapins et chiens, des triturations de placenta ou de carcinome. Il a employé soit la voie veineuse, soit la voie intrapéritonéale.

Après un temps variable, trois jours, dix jours, douze jours, il a fait une prise de sang aux animaux ainsi injectés et a trouvé que leurs sérums réagissaient positivement sur du placenta ou sur du carcinome, selon le tissu injecté antérieurement.

Les tableaux suivants rapportent ses expériences :

1° Animaux ayant reçu une injection de bouillie de placenta.

Lapin ♂. — Injections intra-veineuses (2 cmc.) le 11, le 16, le 21 juin 1913. Prise de sang le 24 juillet.

Résultats :

1 cmc. 5 sérum seul = réaction négative = 0.

1 cmc. 5 sérum + carcinome = réaction négative = 0.

1 cmc. 5 sérum + placenta = réaction positive = +.

Lapin ♂. — Injections intra-péritonéales (2 cmc.) le 10, le 17 novembre. Prise de sang le 24 novembre.

Résultats :

1 cmc. 5 sérum seul = réaction négative = 0.

1 cmc. 5 sérum + carcinome = réaction négative = 0.

1 cmc. 5 sérum + muscle = réaction négative = O.

1 cmc. 5 sérum + foie = réaction négative = O.

1 cmc. 5 sérum + placenta = réaction positive = +.

Chien ♂. — Injections intra-veineuses de 2 cmc. de solution de peptones de placenta le 3, le 6, le 9, le 21 mai. Prise de sang le 26 mai.

Résultats :

1 cmc. 5 sérum seul = réaction négative = O.

1 cmc. 5 sérum + carcinome = réaction négative = O.

1 cmc. 5 sérum + placenta = réaction positive = +.

2° Animaux ayant reçu une injection de bouillie de carcinome.

Lapin ♂. — Injections intra-péritonéales (2 cmc.), le 10, le 17 novembre. Prise de sang le 24 novembre.

Résultats :

1 cmc. 5 sérum seul = réaction négative = O.

1 cmc. 5 sérum + placenta = réaction négative = O.

1 cmc. 5 sérum + muscle = réaction négative = O.

1 cmc. 5 sérum + carcinome = réaction positive = +.

Chien ♂. — Injections intra-péritonéales le 22, le 31 octobre (2 cmc.). Prise de sang le 6 novembre.

Résultats :

1 cmc. 5 sérum seul = réaction négative = O.

1 cmc. 5 sérum seul + carcinome = réaction positive = +.

Ces résultats ont été vérifiés par la méthode optique.

Schlimpert et Hissel ont suivi une orientation nettement différente. Ils expérimentèrent parallèlement sur des placentas humains et sur des placentas d'animaux

(juments, brebis). Leurs conclusions sont les suivantes :

1° La gestation provoque dans le sang de la jument et de la brebis, de même que chez la femme, l'apparition de ferments de défense capables de décomposer les placentas de ces espèces animales.

2° Les ferments d'une espèce animale sont capables de décomposer également les placentas d'une autre espèce animale. On peut remplacer dans le dialyseur le placenta de femme par du placenta de jument, la réaction ne change pas de sens et semble même, dans ce cas plus rapide.

Ces résultats présentent un intérêt d'autant plus vif qu'on a voulu faire jouer un rôle aux franges de chorion du placenta humain dans la formation du ferment actif vis-à-vis de ce placenta.

Or le placenta de jument ne possède pas de villosités choriales.

Expériences personnelles

Avant d'entreprendre des expériences personnelles, nous nous sommes exercée à répéter la réaction sur des sérums de femmes inconnues de nous, dont le sang était prélevé en dehors de notre présence.

Essai des filtres : A propos de l'imperméabilité des filtres à l'albumine nous rapporterons immédiatement un résultat que nous avons constaté au cours de notre travail.

Des filtres reconnus imperméables à la solution d'al-

bumine suivant la technique indiquée par Abderhalden, avaient fourni des résultats corrects au cours de 4 expériences. Or lors d'une cinquième recherche ces filtres se sont montrés devenus perméables vis-à-vis de la sérum-albumine du sang de la femme.

Il aurait pu s'agir d'un sang extrêmement riche en matières dialysables. Nous avons alors essayé à nouveau ces filtres, vis-à-vis de 2 sérums de femmes différentes et vis-à-vis d'un sérum de chienne.

Dans tous ces cas, les filtres ont laissé dialyser des matières donnant une réaction colorée avec la ninhydrine.

Cependant ces filtres éprouvés à nouveau avec la solution d'albumine d'œuf n'ont laissé dialyser aucun produit donnant la réaction colorée.

Il nous semble donc légitime de proscrire la solution d'albumine d'œuf pour vérifier l'imperméabilité des filtres.

Expériences : Nous avons voulu étudier la question suivante : les ferments de défense sont-ils « croisés » chez la femme et chez la chienne ?

C'est-à-dire :

1° Le sérum de chienne gravide décompose-t-il le placenta de chienne.

2° Le sérum de chienne gravide décompose-t-il le placenta de femme.

3° Le sérum de femme gravide décompose-t-il le placenta de chienne.

Le plan des expériences est des plus simples. Le matériel en a été préparé avec toutes les précautions indiquées par Abderhalden.

Le placenta de chienne se prépare comme le placenta de femme.

Expérience I

Le sérum de chienne non gravide décompose-t-il le placenta de chienne et le placenta de femme ?

1° Sérum de chienne seule (1 cmc. 5) = réaction négative.

2° Sérum de chienne non gravide (1 cmc. 5) + placenta de chienne = réaction négative. Pas de coloration du liquide de dialyse par ninhydrine.

3° Sérum de chienne non gravide (1 cmc. 5) + placenta de femme = réaction négative. Pas de coloration du liquide de dialyse par la ninhydrine.

Le sérum de chienne non gravide demeure sans action sur le placenta.

Expérience II

Action du sérum de chienne gravide sur le placenta de femme :

1° Sérum de chienne gravide seul (1 cmc. 5) = réaction négative.

2° Sérum de chienne gravide + placenta de femme = réaction positive (+). La coloration violette provoquée dans le liquide de dialyse par l'adjonction de ninhydrine offre la même intensité que celle obtenue en faisant dialyser un sérum de femme gravide avec du placenta de femme

3° Sérum de chienne gravide (1 cmc. 5) + placenta de femme = réaction positive (+) (Même expérience que précédemment).

La chienne dont nous avons pris le sang ayant reçu une injection de morphine (0 gr. 01 par kilog. d'animal) avant de subir l'opération césarienne destinée à nous procurer son placenta, nous avons jugé intéressant d'étudier la réaction sérique du sang après cette injection (3 heures après l'injection).

Expérience III

1° Sérum de chienne gravide seul (1 cmc. 5) après injection de 0 gr. 01 de morphine par kilogramme d'animal = réaction négative.

2° Sérum de chienne gravide (1 cc. 5) après injection de morphine + placenta de femme = réaction nettement positive (+).

3° Sérum de chienne gravide (1 cmc. 5) après injection de morphine + placenta de femme = réaction nettement positive (+).

Le sérum de chienne gravide a, sur le placenta de femme, la même action que le sérum de femme gravide. L'intensité de la réaction positive colorée est la même dans les deux cas.

Expérience IV

Action du sérum de femme gravide sur le placenta de chienne.

1° Sérum de femme gravide seul (1 cmc. 5) = réaction négative.

2° Sérum de femme gravide (1 cmc. 5) + placenta de femme = réaction positive (+).

3° Sérum de femme gravide A (1 cmc. 5) + placenta de chienne = réaction positive (+).

4° Sérum de femme gravide B (1 cmc. 5) + placenta de chienne = réaction positive (+).

L'intensité de la coloration par la ninhydrine est identique dans les 3 cas positifs.

Le sérum de femme gravide décompose le placenta de chienne.

Expérience V

Action du sérum de chienne gravide sur le placenta de chienne

1° Sérum de chienne gravide seul (1 cmc. 5) = réaction négative.

2° Sérum de chienne gravide (1 cmc. 5) + placenta de femme = réaction positive (+).

3° Sérum de chienne gravide (1 cmc. 5) + placenta de femme = réaction positive (+).

4° Sérum de chienne gravide (1 cmc. 5) + placenta de chienne réaction positive (+).

5° Sérum de chienne gravide (1 cmc. 5) + placenta de chienne = réaction positive (+).

Le sérum de chienne gravide décompose le placenta de chienne.

Mise en dialyse des placentas en présence d'eau distillée.

Pour nous assurer que les placentas employés ne donnaient pas spontanément de produits dialysables décelables à la ninhydrine, nous avons placé dans le dia-

lyseur, la quantité habituelle (0 gr. 50) de placenta en présence de 1 cmc. 5 d'eau distillée.

Même après vingt-deux heures de séjour à l'étuve à 36°, le liquide de dialyse ne réagissait pas avec la ninhydrine.

Expérience VI

Action du sérum de femme gravide sur le placenta de lapine.

Nous avons suivi la même technique que dans les expériences précédentes.

1° Sérum de femme gravide seul (1 cmc. 5) = réaction négative.

2° Sérum de femme gravide (1 cmc. 5) + placenta de femme = réaction positive (+).

3° Sérum de femme gravide (1 cmc. 5) + placenta de lapine = réaction positive (+).

Le sérum de femme gravide décompose le placenta de lapine. (Ce fait a été vérifié au cours de plusieurs autres expériences.)

Expérience VII

Action du sérum de lapin sur le placenta de femme

1° Sérum de lapin seul (1 cmc. 5) = réaction négative.

2° Sérum de lapin (1 cmc. 5) + placenta de femme = réaction négative.

3° Sérum de lapin + placenta de femme = réaction négative.

Le sérum de lapin demeure sans action sur le placenta de femme.

NATURE DES FERMENTS D'ABDERHALDEN

Il est tout naturel de se demander quel rapport il y a entre les ferments d'Abderhalden et les immuns ferments.

Franck et Rosenthal ont envisagé le problème et ont fait des expériences qui concordent d'ailleurs avec celles faites antérieurement par Grüber.

Il y a entre les immuns ferments et les ferments d'Abderhalden des différences assez profondes. Les ferments de défense ne se conservent guère *in vitro* que deux ou trois jours, alors que les immunisines se conservent bien plus longtemps. De même, *in vivo*, les immunisines persistent un temps bien plus long que les quelques semaines pendant lesquelles se manifestent les ferments de défense.

De plus, les immunisines sont encore actives lorsque le sérum est dilué, il n'en est pas de même pour les ferments d'Abderhalden. Les ferments d'Abderhalden apparaissent moins de temps après l'injection que les immunisines.

Enfin si on fait digérer des globules de mouton avec du sérum de mouton hémolytique, on épuise le pouvoir hémolytique, sans que le pouvoir protéolytique diminue.

Tout cela démontre que s'il existe des rapports d'origine entre les immunisines et les ferments de défense, il n'y a pas identité entre eux. Steising a étudié la réactivation au moyen de sérum de cobaye ou de sérum humain, d'un sérum humain inactivé par chauffage à 58°. Il a constaté qu'on pouvait ainsi obtenir des réactions d'Abderhalden positives.

Abderhalden, tout en critiquant certaines parties de ce travail, notamment l'emploi du sérum de cobaye qui, à lui seul, peut décomposer les albumines, a observé, comme Steising, le rôle joué par le complément dans la réaction.

Heilner et Pétri ont prétendu que les ferments en question préexistaient dans le sang à l'injection qui les forme et qu'ils étaient seulement activés. Ils ont dit également qu'il suffisait de produire un hématome chez le sujet qui fournit le sérum pour que ce sérum soit capable de décomposer le placenta.

Abderhalden a répondu en incriminant des fautes de technique qui auraient été commises par les opérateurs.

Heilner et Pétri ont maintenu leur première conclusion.

Abderhalden exécute 600 expériences sur le sujet, expériences qui confirment tout ce qu'il a avancé.

De tout ceci, que pouvons-nous conclure quant à la nature de ces ferments ?

Les ferments d'Abderhalden sont de la classe des al-

buminolysines, mais doués, semble-t-il d'une spécificité toute spéciale.

Il serait oiseux, actuellement de discuter sur la nature d'un ferment que nous connaissons depuis si peu de temps. Il faut d'abord déterminer exactement ses effets, afin de pouvoir logiquement remonter à la cause.

CONCLUSIONS

I. — Conclusion des recherches antérieures

Il serait prématuré de vouloir tirer des conclusions définitives de travaux encore aussi récents. Nous ne concluons donc point ici, au sens exact du mot : Nous nous contenterons de rappeler quelques-uns des points principaux sur lesquels nous avons cru devoir insister.

La réaction d'Abderhalden doit être exécutée avec la plus stricte méticulosité, en suivant pas à pas les indications de son auteur (sauf une très minime exception indiquée ci-dessous).

La préparation des organes est le point le plus délicat de la technique, et c'est d'incorrections à ce stade des opérations que dérivent les quelques divergences qui séparent les auteurs.

Dans la grossesse, ses résultats atteignent une certitude rarement rencontrée dans les méthodes biologiques.

Dans le cancer les résultats sont sensiblement aussi bons.

Pour les autres maladies, on ne peut traiter d'échec

les quelques cas où la réaction prévue positive s'est trouvée négative. Le choix de l'organe essayé pouvait être mauvais.

Dans les affections du thyroïde, les résultats obtenus ont montré la sensibilité de la méthode, ou mettait en évidence des formes larvées de l'affection.

II. — Conclusion de nos expériences

I. — Le sérum de chienne non gravis ne décompose pas le placenta de chienne ;

II. — Le sérum de chienne non gravis ne décompose pas le placenta de femme ;

III. — Le sérum de chienne gravis décompose le placenta de chienne ;

IV. — Le sérum de femme gravis décompose le placenta de chienne ;

V. — Le sérum de chienne gravis décompose le placenta de femme ;

VI. — Le sérum de femme gravis décompose le placenta de lapine ;

VII. — Le sérum de lapin ne décompose pas le placenta de femme.

L'épreuve de l'imperméabilité des dialyseurs doit être effectuée au moyen de sérum et non d'albumine d'œuf ainsi que cependant l'indique Abderhalden.

Les travaux d'Abderhalden sont d'une importance capitale et qu'on ne peut saisir complètement encore

aujourd'hui. Leur intérêt n'est pas tant de permettre un diagnostic de grossesse, de cancer ou d'autre affection, mais d'éclairer d'un jour nouveau l'histoire des réactions spécifiques humérales.

Vu : le Président de la thèse

RICHET

Vu : le Doyen.

LANDOUZY

Vu et permis d'imprimer :

Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris,

L. LIARD

BIBLIOGRAPHIE

Revue d'ensemble sur les échanges cellulaires, la constitution des cellules, des espèces déterminées, des individus et des organes.

EMIL ABDERHALDEN. — Die Bedeutung der Verdauung für den Zellstoffwechsel im Lichte neuerer Forschungen auf dem Gebiete der physiologischen chemie. *Zeitschr. des Österreichischen Ingenieur u. Architekten Vereins*, 1911, Nr. 11 u., 12 und im Verlag Urban u. Schwarzenber-Berlin-Wien., 1911.

- Neuere Anschauungen über den Bau und den Stoffwechsel der Zelle. *Julius Springer*, Berlin, 1911.
- Les conceptions nouvelles sur la structure et le métabolisme de la cellule. *Revue générale des sciences pures et appliquées*, 23 Jahrg. Nr. 3. S. 95. Febr. 1911.
- Synthese der Zellbausteine in Pflanze und Tier. Febr. 1912. *Julius Springer*, Berlin.
- Lehrbuch der physiologischen chemie, 1 und 2. Aufl. Urban u. Schwarzenberg, *Berlin -Wien.*, 1906 u. 1909.

Étude comparée de la composition du lait et du nourrisson

EMIL ABDERHALDEN. — Die Beziehungen der Zusammensetzung der Asche des säuglings zu derjenigen der Asche der Milch. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 26, 1899, S. 498.

EMIL ABDERHALDEN. — Die Beziehungen der Wachstumsgeschwindigkeit des Säuglings zur Zusammensetzung der Milch beim Kaninchen, bei der Katze und beim Hunde. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 26, 1899. S. 487.

— Die Beziehungen der Zusammensetzung der Asche des Säuglings zu derjenigen der Asche der Milch beim Meerschweinchen. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 27, 1899. S. 336.

— Die Beziehungen der Wachstumsgeschwindigkeit des Säuglings zur Zusammensetzung der Milch beim Hunde, beim Schwein, beim Schaf, bei der Ziege und beim Meerschweinchen. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 27, 1899. S. 408 und 594.

Emploi de différentes sources d'azote par les organismes, inférieurs

EMIL ABDERHALDEN UND PETER RONA. — Die Zusammensetzung des « Eiweisses » von *Aspergillus niger* bei verschiedener Stickstoffquelle. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 46, 1905. S. 179.

EMIL ABDERHALDEN UND YUTAKA TERUUCHI. Kulturversuche mit *Aspergillus niger* auf einigen Aminosäuren und Polypeptiden. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 47, 1906. S. 394.

Étude des ferments protéolitiques et peptolytiques des tissus végétaux et animaux

1° Technique pour reconnaître les ferments protéolytiques et peptolytiques

EMIL ABDERHALDEN UND ALFRED SCHITTENHEIM. — Über den Nachweis peptolytischer Fermente. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 60, 1909. S. 421.

- EMIL ABDERHALDEN. — Notiz zum Nachweis peptolytischer Fermente in Tier- und Pflanzengewebe. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 66, 1910. S. 137.
- EMIL ABDERHALDEN UND HANS PRINGSHEIM. — Beitrag zur Technik des Nachweises intracellulärer Fermente. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 65, 1910. S. 180.
- EMIL ABDERHALDEN. — Die optische Methode und ihre Verwendung bei biologischen Fragestellungen. *Handbuch der biochem. Arbeitsmethoden*, 5, 1911. S. 575.

2° Etude de l'action des ferments protéolytiques
et peptolytiques

- EMIL FISCHER UND EMIL ABDERHALDEN. — Über das Verhalten verschiedener Polypeptide gegen Pankreasferment. *Sitzungsberichte der Kgl. preussischen Akademie der Wissenschaften*, X, 1905.
- Über das Verhalten verschiedener Polypeptide gegen Pankreassaft und Magensaft. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 46, 1905. S. 52.
- Über das Verhalten einiger Polypeptide gegen Pankreassaft. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 51, 1907. S. 264.
- EMIL ABDERHALDEN UND A.-H. KOELKER. — Die Verwendung optisch-aktiver Polypeptide zur Prüfung der Wirksamkeit proteolytischer Fermente. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 51, 1907. S. 294.
- EMIL ABDERHALDEN UND LEONOR MICHAELLIS. — Der Verlauf der fermentativen Polypeptidspaltung. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 52, 1907. S. 326.
- EMIL ABDERHALDEN UND ALFRED GIGON. — Weiterer Beitrag zur Kenntnis des Verlaufs der fermentativen Polypeptidspaltung. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 53, 1907. S. 251.
- EMIL ABDERHALDEN UND A.-H. KOELKER. — Weitere Beiträge zur Kenntnis der fermentativen Polypeptidspaltung. IV und V. Mitteilung. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 54, 1908. S. 363 und 55, 1908. S. 416.

- EMIL ABDERHALDEN UND CARL BRAHM. — Zur Kenntnis des Verlaufs der fermentativen Polypeptidspaltung. VI. Mitteilung. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 57, 1908. S. 342.
- EMIL ABDERHALDEN, G. CAEMMERER UND L. PINKUSOHN. — Zur Kenntnis des Verlaufs der fermentativen Polypeptids-
tug. VII. Mitteilung. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 59, 1909, S. 293.

*Etude sur la présence des ferments protéolytiques
et peptolitiques*

- EMIL ABDERHALDEN UND PETER KONA. — Das Verhalten des Glycyl-tyrosins im Organismus des Hunde bei subkutaner Einführung. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 46, 1905. S. 176.
- EMIL ABDERHALDEN UND YUTAKA TERUUCHI. — Das Verhalten einiger polypeptide gegen Organextrakte. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 47, 1906. S. 466.
- EMIL ABDERHALDEN UND ALFRED SCHITTENHELM. — Die Wirkung der proteolytischen Fermente keimender Samen des Weizens und der Lupinen auf polypeptide. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 49, 1906. S. 26.
- EMIL ABDERHALDEN UND PETER RONA. — Das Verhalten von Leucyl-phenylalanin, Leucyl-glycyl-glycin und von Alanyl-glycyl-glycin gegen Press-saft der Leber vom Rinde. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 49, 1906. S. 31.
- EMIL ABDERHALDEN UND ANDREW HUNTER. — Weitere Beiträge zur Kenntnis der proteolytischen Fermente der tierischen Organe. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 48, 1906. S. 537.
- EMIL ABDERHALDEN UND YUTAKA TERUUCHI. — Studien über die proteolytische Wirkung der Press-säfte einiger tierischer Organe sowie des Darmsaftes. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 39, 1906. S. 1.
- Vergleichende Untersuchungen über einige proteolytische Fermente pflanzlicher Herkunft. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 49, 1907. S. 21.

- EMIL ABDERHALDEN UND FILIPPO LUSSANA. — Weitere Versuche den Abbau von Polypeptiden durch die Press-säfte von Zellen und Organem. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 55, 1908. S. 390.
- EMIL ABDERHALDEN UND AUGUSTE RILLIET. — Über die Spaltung einiger Polypeptide durch den Press-saft von *Psalliota campestris* (champignon). *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 55, 1908. S. 395.
- EMIL ABDERHALDEN UND DAMMHAHN. — Über den Gehalt und gekeimter Samen verschiedener Pflanzenarten an peptolytischen Fermenten. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 57, 1908. S. 332.
- EMIL ABDERHALDEN UND HANS PRINGSHEIM. — Studien über die Spezifität der peptolytischen Fermente bei verschiedenen Pilzen. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 59, 1909. S. 249.
- EMIL ABDERHALDEN UND ROBERT HEISE. — Über das Vorkommen peptolytischer Fermente bei den Wirbellosen. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 62, 1909. S. 136.
- EMIL ABDERHALDEN UND EUGEN STEINBECK. — Weitere Untersuchungen über die Verwendbarkeit des Seidenpeptons Zum Nachweis peptolytischer Fermente. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 68, 1910. S. 312.
- EMIL ABDERHALDEN. — Über den Gehalt von Eigeweidewürmern an peptolytischen Fermenten. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 74, 1911. S. 409.
- EMIL ABDERHALDEN UND HEINRICH GEDDERT. — Darstellung optisch-aktiver Polypeptide aus Kacemkörpern. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 74, 1911. S. 394.
- EMIL ABDERHALDEN UND H. DEETJEN. — Über den Abbau einiger Polypeptide durch die Blutkörperchen des Pferdes. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 51, 1907. S. 334.
- EMIL ABDERHALDEN UND BERTHOLD OPPLER. — Über das Verhalten einiger Polypeptide gegen Blutplasma und serum vom Pferde. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, § 3, 1907. S. 294.
- EMIL ABDERHALDEN UND H. DEETJEN. — Weitere Studien über den Abbau einiger Polypeptide Durch die roten Blutkörper-

- perchen und die Blutplättchen des Pferderblutes. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, § 3, 1907. S. 280.
- EMIL ABDERHALDEN UND PETER RONA. — Das Verhalten Blutserum und Harn gegen glycyL-tyrosin unter verschiedenen Bedingungen. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 53, 1907. S. 308.
- EMIL ABDERHALDEN UND WILFRED MANWARING. — Über den Abbau einiger Polypeptide durch die roten Blutkörperchen der Rinderblutes. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 55, 1908. S. 377.
- EMIL ABDERHALDEN UND JAMES MC. LESTER. — Über das Verhalten einiger Polypeptide gegen das Plasma des Rinderblutes. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 55, 1908. S. 371.
- EMIL ABDERHALDEN. — Zur Kenntnis des Vorkommens der peptolytischen Fermente. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 78, 1912. S. 344.

*Etude sur l'action des ferments dans les cellules
des tumeurs et des bactéries*

- EMIL ABDERHALDEN. — Neue Forschungsrichtungen auf dem Gebiete der Störungen der Zellstoffwechsels. *Arch. f. wissenschaftl. und praktische Tierheilkunde*, 36, 1910. S. 1.
- Studium über den Stoffwechsel von Geschwulstzellen. *Zeitschr. f. Krebsforschung*, 9, 1910. 2 H.
- EMIL ABDERHALDEN UND PETER RONA. — Zur Kenntnis der peptolytischen Fermente verschiedenartiger Krebse. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 60, 1909. S. 411.
- EMIL ABDERHALDEN, A.-H. KOELKER UND FLORENTIN MEDIGRECEANU. — Zur Kenntnis der peptolytischen Fermente verschiedenartiger Krebse und anderer Tumorarten. II Mitteilung. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 62, 1909. S. 145.
- EMIL ABDERHALDEN UND FLORENTIN MEDIGRECEANU. — Zur Kenntnis der peptolytischen Fermente verschiedenartiger Krebse und anderer Tumorarten. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 66, 1910. S. 265.

EMIL ABDERHALDEN UND LUDWIG PINCUSOHN. — Zur Kenntnis der peptolytischen Fermente verschiedenartiger Krebse und anderer Tumorarten. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 66, 1910, S. 277.

EMILE ABDERHALDEN, LUDWIG PINCUSOHN UND ADOLF WALTHER. — Untersuchungen über die Fermente verschiedener Bakterienarten. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 68, 1910, S. 471.

Emploi de la méthode optique. Technique.

EMIL ABDERHALDEN. — Die optische Methode und ihre Verwendung bei biologischen Fragestellungen. *Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden*, 5, 1911, S. 575.

— Die Anwendung der « optischen Methode » auf dem Gebiete der Immunitätsforschung. *Med. Klinik. Jahrg.*, 1909, Nr. 41.

— Die Anwendung der optischen Methode auf dem Gebiete der Physiologie und Pathologie. *Zentralbl. f. Physiol.*, XXIII, Nr. 25.

Les ferments de défense après introduction d'albumines étrangères et de peptones

EMIL ABDERHALDEN UND LUDWIG PINCUSOHN. — Über den Gehalt der Kaninchen und Hundeplasmas an peptolytischen Fermenten unter verschiedenen Bedingungen, 1. Mitt. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 61, 1909, S. 200.

EMIL ABDERHALDEN UND WOLFGANG WEICHARDT. — Über den Gehalt der Kaninchenserums an peptolytischen Fermenten unter verschiedenen Bedingungen. II. Mitteilung. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 62, 1909, S. 120.

EMIL ABDERHALDEN UND LUDWIG PINCUSOHN. — Über den Gehalt der Hundeblutserums an peptolytischen Fermenten un-

ter verschiedenen Bedingungen. III. Mitteilung. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 62, 1909. S. 243.

EMIL ABDERHALDEN UND LUDWIG PINCUS-SOHN. — Serologische Studien mit Hilfe der « optischen methode ». IV. Mitteilung. *Zeitech. f. physiol. chem.*, 64, 1910. S. 100.

EMIL ABDERHALDEN UND K.-B. IMMISCH. — Serologische Studien mit Hilfe der « optischen Methode ». V. Mitteilung. *Zeitsch. f. physiol. chem.*, 64, 1910. S. 423.

EMIL ABDERHALDEN UND A. ISRAEL. — Serologische Studien mit Hilfe der « Optischen Methode » VI. Mitteilung. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 64, 1910. S. 426.

EMIL ABDERHALDEN UND J.-G. SLEESWYK. — Serologische Studien mit Hilfe der « optischen Methode ». VII. Mitteilung. *Zeitschr. f. physiolog. chem.*, 64, 1910. S. 427.

EMIL ABDERHALDEN UND LUDWIG PINCUS-SOHN. — Serologische Studien mit Hilfe der « optischen Methode ». IX. Mitteilung. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 64, 1910, S. 433.

— Serologische Studien mit Hilfe der « optischen Methode » X. Mitteilung. *Zeitschr. f. physiol. f. chem.*, 66, 1910. S. 66.

— Serologische Studien mit Hilfe der « optischen Methode » XIII. Mitteilung. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 71, 1911. S. 110.

EMIL ABDERHALDEN UND F. RATHSMANN. — Serologische Studien mit Hilfe der « optischen Methode » XIV, Mitteilung. *Zeitsch f. physiol. chem.*, 71, 1911 S. 367.

EMIL ABDERHALDEN UND BENOMAR SCHILLING. — Serologische Studien mit Hilfe der « optischen Methode » XV. Mitteilung. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 71, 1911. S. 385.

EMIL ARDERHALDEN UND ERNST KAMPF. — Serologische Studien mit Hilfe der « optischen Methode » XVI. Mitteilung. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 71, 1911. S. 421.

**Les ferments de défense après introduction d'hydrates
de carbone étrangers au sang et au corps**

EMIL ABDERHALDEN UND CARL BRAHM. — Serologische Studien mit Hilfe der « optischen Methode » VIII. Mitteilung. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 64, 1910. S. 429.

EMIL ABDERHALDEN UND GEORG KAPFBERGER. — Serologische Studien mit Hilfe der « optischen Methode » XI. Mitteilung. Parenterale Zufuhr von Kohlehydraten. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 69, 1910. S. 23.

EMIL ABDERHALDEN UND JULIUS SCHMIDT. — Bestimmung der Blutmenge mit Hilfe der « optischen Methode ». *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 66, 1910. S. 120.

EMIL ABDERHALDEN UND ARTHUR WEIL. — Beobachtungen über das Drehungsvermögen des Blutplasmas und serums verschiedener Tierarten verschiedenen Alters und Geschlechts. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 81, 1912. S. 233.

EMIL ABDERHALDEN UND T. KASHIWADO. — Studien über die Kerne der Thymusdrüse und Anaphylaxieversuche mit Kernsubstanzen. *Zeitschr. f. physiolog. chem.*, 81, 1912. S. 285.

EMIL ABDERHALDEN. — Weitere Studien über Anaphylaxie. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 82, 1912. S. 109.

Les ferments de défense après introduction de graisses

EMIL ABDERHALDEN UND PETER RONA. — Studien über das Fettspaltungsvermögen der Blutes und serums des Hundes unter verschiedensten Bedingungen. *Zeitsch. f. physiol. chem.*, 75, 1911. S. 30.

EMIL ABDERHALDEN UND ANO ED. LAMPÉ. — Weitere und das Plasmas unters verschiedenastigen Bedingungen. *Zeitsch. f. physiol. chem.*, 78, 1912. S. 396.

Les ferments de défense après introduction de corps étrangers au sang mais faisant partie de l'organisme

EMIL ABDERHALDEN, R. FREUND UND LUDWIG PINCUSOHN. — Serologische Untersuchungen mit Hilfe der « optischen Methode » während der Schwangerschaft und speziell bei Eklampsie. *Praktische Ergebnisse der Geburtshilfe und Gynäkologie*, II. Jahrg. II. Abt. 1910. S. 367.

EMIL ABDERHALDEN UND MIKI KIUTSI. — Biologische Untersuchungen über Schwangerschaft. Die Diagnose der Schwangerschaft mittels der « optischen Methode » und dem Dialysierverfahren. *Zeitsch. f. physiol. chem.*, 77, 1912. S. 249.

**Considération sur l'immunité
et spécialement sur l'anaphylaxie**

CH. RICHTET. — L'Anaphylaxie. Paris, 1912 (avec Bibliographie).

E. FRIEDBERGER et ses collaborateurs. — Nombreux travaux sur l'anaphylaxie dans: *Zeitschr. f. Immunitätsforschung und experimentelle Medizin*.

E. FRIEDBERGER. — Die Anaphylaxie mit besonderer Berücksichtigung ihrer Bedeutung für Infektion und Immunität: *Deutsche med. Wochenschr.* 1911. Nr II.

— Die Anaphylaxie, Fortschritte der Deutsch. Klinik. 2, 1911. S. 619.

— Über das Wesen und die Bedeutung der Anaphylaxie. *Münchener med. Wochenschr.* 1910. Nr. 50 und 51.

ERNST MORO. — Experimentelle und klinische Überempfindlichkeit (Anaphylaxie) J. F. Bergmann, Wiesbaden. 1910.

HERMANN PFEIFFER. — Das Problem der Eiweisanaphylaxie. Goustar Fischer, Jéna, 1910.

CLEMENS VON PIRQUET. — Allergie, Julius Springer, Berlin, 1910.

ROBERT KOESSLE. — Fortschritte der Cytotoxinforschung. J.-F. Bergmann, Wiesbaden, 1910.

- WOLFGANG WEICHARDT. — Jahresbericht über die Ergebnisse der Immunitätsforschung. Bibliographie.
- ALFRED SCHITTENHELM. — Über Anaphylaxie von Standpunkt der pathologischen Physiologie und der Klinik, *Jahresbericht über die Ergebnisse der Immunitätsforschung*, 1910. Ferdinand Enke. Stuttgart.
- EDGAR ZUNZ. — A propos de l'Anaphylaxie. Bruxelles, 1911.
- ERNST HEILNER. — Über die Wirkung grosser Mengen artfremden Blutserums im Tierkörper nach Zufuhr per os und subkutan, *Zeitsch. f. Biol.*, 50, 1907. S. 26.
- ERNST HEILNER. — Versuch eines indirekten Fermentnachweises (durch. Alkoholzufuhr); Zugleich ein Beitrag zur Frage der Überempfindlichkeit, *Münchener med. Wochenschr.* 1908. Nr. 49.
- Über das Schicksal des subkutan eingeführten Rohrzuckers im Tierkörper und seine Wirkung auf Eiweiss- und Fettstoffwechsel. *Zeitschr. f. Biol.*, 61. 1911. S. 75.
 - Über die Wirkung künstlich erzeugter physikalischer (osmotischer). Vorgänge im Tierkörper auf dem Gesamtstoffumsatz mit Berücksichtigung der Frage von der « Überempfindlichkeit » *Zeitschr. f. Biol.*, 1908. S. 476.
- HERTLE UND HERMANN PFEIFFER. — Über Anaphylaxie gegen Artgleiches blutfremdes Eiweis. *Zeitschr. f. Immunitätsforschung und exper. Therap.*, 10, 1911. S. 541.
- TH. HEYNEMANN. — Eine « Reaktion » in serum Schwangerer, Kreissender und Wöchnerinnen. *Arch. f. Gynæk.*, 90. 1910. Heft. 2.
- G. KAPSENBERG. — Studien über immunität und Zellzerfall. *Zeitschr. f. Immunitätsforschung*. 12, '912. S. 477.
- KORNEL VON KOROESY. — Über parenterale Eiweisszufuhr. *Zeitsch. f. physiol. chem.*, 62, 1909. S. 76. 69. 1909. S. 313.
- L. LOMMEL. — Über die Zersetzung parenteral eingeführten Eiweisses in Tierkörper, Verhandl. des Kongresses für innere Medizin. 24. 1907. S. 290, und *Arch. f. exper. Path. u. Pharm.*, 58. 1908. S. 50.

- LEONOR MICHAELIS UND PETER RONA. — Untersuchungen über dem parenteralem Eiweisstoffwechsel. *Pflügers. Arch. für die gesamte Physiologie*, 71, 1908. S. 163 ; 73, 1908. S. 406; 74, 1908. S. 578.
- CARL OPPENHEIMER. — Über das Schicksal der mit Umgehung der Darmkanale eingeführten Eiweisstoffe im Tierkörpern. *Hofmeisters Beiträge*, 4, 1903. S. 263.
- H. PFEIFFER UND S. MITA. — Experimentelle Beiträge zur Kenntnis der Eiweiss-Antieiweissreaktion. *Zeitschr. f. Immunitätsforschung und exper. Therap.*, 6, 1910. S. 18.
- HERMANN PFEIFFER UND A. JAVISCH. — Zur Kenntnis der Eiweisszerfallstoxikosen. *Zeitschr. f. Immunitätsforschung und exper. Therap.*, 16, 1912. S. 38.
- H. PFEIFFER. — Neue Gesichtspunkte zum Nachweis von Eiweisszerfallstoxikosen. *Mitteil. des Vereins der Ärzte in Steiermark*. Nr. 8, 1912.
- GIACOMO PIGHINI. — Über die Bestimmung der enzymatischen Wirkung der Nuclease mittel « optischer Methode ». *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 70, 1910-1911. S. 85.
- GOTTLIEB SALUS. — Versuche über Serumgiftigkeit und Anaphylaxie. *Med. Klinik. Jahrg.*, 1909. Nr. 14.
- HEINRICH SCHLECHT. — Über experimentelle Eosinophilie nach parenteraler Zufuhr artfremden Eiweisses und über die Beziehungen der Eosinophilie zur Anaphylaxie. Habilitationsschrift. F. C. W. Vogel, Leipzig, 1912.
- VOLFGANG WEICHARDT. — Über Syncytiolysine. *Hygien. Rundschau*, 1903. Nr. 10. Voir aussi *Münchener med. Wochenschr.*, 1901. Nr. 52, et *Deutsche med. Wochenschr.*, 1902. Nr. 35.
- WOLFGANG WEICHARDT. — Studien über das Wachstum und den Stoffwechsel von Typhus- und Colibacillus und über die Tätigkeit ihrer Fermente. *Zentralbl. f. die gesamte Physiol. und Path. des Stoffwechsels*. N. F. Jahrg., 5 1910. S. 131.
- E. WEINLAND. — Über das Auftreten von Invertin im Blut. *Zeitschr. f. Biol.*, 47, 1907. S. 279.

- BRUNO BLOCH UND RUDOLF MASSINI. — Studien über Immunität und Überempfindlichkeit bei Hyphomyzetenkrankungen. *Zeitschr. f. Hygiene*, 63, 1909. S. 68.
- GUSTAV VON BUNGE. — Der Kali, Natron- und Chlorgehalt der Milch, verglichen mit dem anderer Nahrungsmittel und des Gesamtorganismus der Säugetiere. *Zeitschr. f. Biol.*, 10, 1874. S. 295 und 323.
- Lehrbuch der Physiologie des Menschen, 2, 1901. S. 103.
- W. CRAMER. — On the assimilation of protein introduced parentally. *Journ. of physiol.*, 37, 1908. S. 146.
- P. ESCH. — Über Harn- und Serumtoxizität bei Eklampsie. *Münchener med. Wochenschr.*, 59, 1912. S. 461.
- EMIL FISCHER. — Bedeutung der Stereochemie für die Physiologie. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 26, 1898-1899. S. 60.
- RUPERT FRANZ. — Über das Verhalten der Harntoxizität in der Schwangerschaft, Geburt und im Wochenbett. *Arch. f. Gynækol.*, 96, 1911, Heft 2.
- U. FRIEDEMANN UND S. ISAAC. — Über Eiweissimmunität und Eiweissstoffwechsel. *Zeitschr. f. exper. Path. u. Therap.*, 1, 1905. S. 513, 3, 1906. S. 209 und 4, 1907. S. 830.
- G. B. GRUBER. — Peptolytische Stoffe und Immunkörper im Blut. *Zeitschr. f. Immunitätsforschung und exper. Therap.*, 7, 1910. S. 762.

**Travaux sur la réaction d'Abderhalden
parus depuis 1912**

- EMIL ABDERHALDEN. — Diagnose der Schwangerschaft mit Hilfe der optischen Methode und der Dialysierverfahrens. *Münchener med. Wochenschr.*, 1912, Nr. 24.
- Weiterer Beitrag zur Diagnose der Schwangerschaft mittelst der optischen Methode und des Dialysierverfahrens. *Münchener med. Wochenschr.*, 1912. Nr. 36.

EMIL ABDERHALDEN. — Weiterer Beitrag zur biolog. Feststellung der Schwangerschaft. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 81, 1912. S. 90.

- Die Diagnose der Schwangerschaft mittels der optischen Methode und des Dialysierverfahrens. *Berliner tierärztl. Wochenschr.*, 1912. Nr. 25.
- Nachtrag Zu : Weiterer Beitrag zur biologischen Feststellung der Schwangerschaft. *Münchener med. Wochenschr.*, 40, 1912 und *Berliner tierärztl. Wochenschr.*, 1912. Nr. 42.

EMIL ABDERHALDEN UND ARTHUR WEIL. — Über die Diagnose der Schwangerschaft bei Tieren mittels der optischen Methode und des Dialysierverfahrens. *Berliner tierärztl. Wochenschr.*, 1912, n° 36.

EMIL ABDERHALDEN. — Die optische Methode und das Dialysierverfahren als Methoden zum Studium von Abwehrmassregeln des tierischen Organismus. Die Diagnose der Schwangerschaft bei Mensch und Tier Mittels der genannten Methoden. *Handb. der biochemischen Arbeitsmethoden*. 6. 1912. S. 223.

- Die Serodiagnostik der Schwangerschaft. *Deutsch. med. Wochenschr.*, 1912, n° 46.
- Ausblicke über die Verwertbarkeit der Ergebnisse neuerer forschungen auf dem Gebiete des Zellstoffwechsels zur Lösung von Fragestellungen auf dem Gebiete der Pathologie des Nervensystems. *Deutsch. med. Wochenschr.*, 1912, n° 88.

EMIL ABDERHALDEN. — Der Nachweis blutfremder Stoffe mittels des Dialysierverfahrens und der optischen Methode und die Verwendung dieser Methoden mit den ihnen zugrunde liegenden Auschaungen auf dem Gebiete der Pathologie. *Beiträge zur Klinik. der Infektionskrankheiten und zur Immunitätsforschung*, 1. 1913. Heft 2. S. 243.

- Zur Frage der Spezifität der Schutzfermente. *Münchener med. Wochenschr.*, 1913, n° 9.

- EMIL ABDERHALDEN. — Über eine mit dem Polarisations apparat kombinierte elektrischheizbare Vorrichtung zur Ableitung und Beobachtung des Drehungsvermögens bei Konstanter Temperatur. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 84, 1913. S. 300.
- EMIL ABDERHALDEN UND ARNO LAMPÉ. — Über den Einfluss der Ermüdung auf den Gehalt des Blutserums an dialysierbaren, mit triketohydrindenhydrat reagierenden Verbindungen. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 85. 1913. S. 136.
- EMIL ABDERHALDEN UND HUMBERT SCHMIDT. — Einige Beobachtungen und Versuche mit Triketohydrindenhydrat (Ruhemann). *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 85. 1913. S. 143.
- EMILE ABDERHALDEN — Die Diagnose der Schwangerschaft mittels des Dialysierverfahrens und der optischen Methode. *Monatsschrift. f. Geburtshilfe u. Gynäkologie*, 38. 1913. S. 24.
- EMIL ABDERHALDEN UND PETER ANDRYEWSKY. — Über die Verwendbarkeit der optischen Methode und des Dialysierverfahrens bei Infektionskrankheiten. Untersuchungen über Tuberkulose bei Rindern. *Münchener med. Wochenschr.*, 29. Juli 1913, n° 30. S. 1641.
- EMIL ABDERHALDEN UND ARTHUR WEIL. — Beitrag zur Kenntnis der Fehlerquellen des Dialysierverfahrens bei serologischen Untersuchungen. Über den Einfluss des Blutgehaltes der Organe. *Münchener med. Wochenschr.*, 1913. S. 1703.
- EMIL ABDERHALDEN UND ANDOR FODOR. — Über Abwehrfermente im Blutserum schwangerer und von Wöchnerinnen, die auf Milchzucker eingestellt sind. *Münchener med. Wochenschr.*, 1913, n° 34. S. 1880.
- EMIL ABDERHALDEN UND ERWIN SCHIFF. — Weiterer Beitrag zur Kenntnis der Spezifität der Abwehrfermente. Das Verhalten des Blutserums schwangerer Kaninchen gegenüber verschiedenen organen. *Münchener med. Wochenschr.*, 1913. S. 1923.

EMIL ABDERHALDEN UND ANDOR FODOR. — Studien über die Spezifität der Zellfermente mittels der optischen Methode. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 87. 1913. S. 220.

EMIL ABDERHALDEN UND ERWIN SCHIFF. — Studien über die Spezifität der Zellfermente mittels der optischen Methode. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 87. 1913. S. 231.

— Versuche über die Geschwindigkeit des Auftretens von Abwehrfermenten nach wiederholter Einführung des plasmafremden Substrates. *Zeitschr. f. physiol. chem.*, 87, 1913. S. 225.

EMIL ABDERHALDEN. — Gedanken über den spezifischen Bau der Zellen der einzelnen Organe und ein neues biologisches Gesetz. *Münchener medizin. Wochenschr.*, 60, 1913. S. 2386.

— Zur Frage über den Einfluss des Blutgehaltes der Substrate auf das Ergebnis der Prüfung auf spezifisch eingestellte Abwehrfermente mittels des Dialysierverfahrens. *Münch.*, 16 décembre 1913.

— Blutgehalt der Substrate bei Prüfung des Dialysierverfahrens. *Münch. med. Woch.*, n° 50, 1913.

— Verwertbarkeit des Dialysierverfahrens bei klinischen und biologischen Fragestellungen. *Münch. med. Woch.*, n° 5, 3 février 1914.

— Die Bedeutung und die Herkunft der sog. Abwehrfermente. *Deutsch. med. Woch.*, n° 6, 5 février 1914.

— Weitere Beobachtungen über die spezifische Wirkung des sogenannten Abwehrfermente. *Münch. mediz. Woch.*, n° 8, 24 février 1914.

LE LORIER. — *Semaine Médicale*, 1913, page 357.

FIEUX ET DAUTIN. — *Semaine Médicale*, 1912, p. 261.

ERICH FRANK UND FRITZ HEIMANN. — Die Biologische Schwangerschaftsdiagnose nach Abderhalden und ihre klinische Bedeutung. *Berliner Klin. Wochenschr.*, 1912. Nr. 36.

FRANZ (R.) UND JARISCH (A.). — Beiträge zur Kenntnis der serologischen Schwangerschaftsdiagnostik. *Wiener Klin. Wochenschr.* 1912. Nr. 39.

- VEIT (J.). — Bewertung und Verwertung der Serodiagnostik der Schwangerschaft. *Zeitsch f. Geburtshilfe u. Gynäkologie*, 72, 1912, S. 463.
- FAUSER (A.). — Einige Untersuchungsergebnisse und klinische Ausblicke auf Grund der Abderhaldenschen Anschauungen und Methodik. *Deutsche med. Wochenschr.* 1912. S. 52.
- HENKEL (M.). — Zur biologischen Diagnose der Schwangerschaft *Archiv. f. Gynæk.*, 99, 1912, S. 1.
- LINDIG (P.). — Über Serumfermentwirkungen bei Schwangerem u. Tumorkranken. *Münchener med. Wochenschr.* 1913, Nr. 6. Voir aussi E. Abderhalden: 1913. Nr. 8.
- FAUSER (A.). — Weitere Untersuchungen (3^e liste) auf Grund des Abderhaldenschen Dialysierverfahrens. *Deutsche med. Wochenschr.*, 1913, Nr. 7.
- BRUNO STANGE. — Zur Eklampsiefrage. *Zentralbl. f. Gynæk.*, 137, 1913.
- HANS FALK. — Das Dialysierverfahren nach Abderhalden, eine Methode zur Diagnose der Frühmilchendseins der Kühe. *Berliner tierärztll. Wochenschr.*, 1913, Nr. 8.
- ERNST ENGELHORN. — Zur biologischen Diagnose der Schwangerschaft. *Munchener med. Wochenschr.*, 1913, Nr. 11.
- FRITZ HEIMANN. — Die Serodiagnostik der Schwangerschaft. *Die Naturwissenschaften*, 1, 1913, S. 283.
- HENRY SCHWARZ. — Abderhaldens serodiagnosis of pregnancy and its practical application. *Interstate med. journ.*, 20, 1913. S. 195.
- CARLO FERRARI. — Ricerche sulla diagnosi della gravidanza col metodo polariscopo e col metodo della dialisi. *Liguria medica.*, 7. 1913, Nr. 5-6.
- HANS SCHLIMPERT UND JAMES HENDRY. — Erfahrungen mit der Abderhaldenschen Schwangerschaftsreaktion (Dialysierverfahren und Ninhydrinreaktion) *Munchner med. Wochenschr.*, 1913, Nr. 13.
- FAUSER (A.). — Zur Frage des Vorhandenseins spezifischer Schutzfermente im Serum von Geisteskranken. *Munchener med. Wochenschr.*, 1913. Nr. 11.

- CAIFAMI (P.). — Sulla Seradiagnosi della gravidanza col metodo della dialisi, secondo Abderhalden. *Bolletina della R. Acad. med. di Roma*, 39, 1911. Nr. 3-4.
- CESARE DECIO. — Prime ricerche sull'applicazione della reazione di Abderhalden nel campo ostetrico *Annali di Ostetricia e Ginecologia*, 1913.
- JULIUS BAUER. — Über Organabbauende Fermente im Serum bei endemischem Kropf. *Wiener Klin. Wochenschr.*, 26, 1913. Nr. 16.
- EMIL EPSTEIN. — Die Abderhaldensche serumprobe auf Karzinom. *Wiener Klin. Wochenschr.*, 26, 1913. Nr. 17.
- RUDOLF EKLER. — Erfahrungen mit der biologischen Diagnose der Schwangerschaft nach Abderhalden *Wiener Klin. Wochenschr.*, 26, 1913. Nr. 18.
- REINES. — Bericht über Versuche bei Sklerodermie. *Wiener Klin. Wochenschr.*, 26, 1913. Nr. 18. S. 729.
- PALTAUF. — Untersuchung eines Falles von Chorionepitheliom. *Wiener Klin. Wochenschr.*, 26, 1913. Nr. 18. S. 729.
- OTTO W. LEDERER. — Bericht über Serodiagnose der Schwangerschaft. *Wiener Klin. Wochenschr.*, 26, 1913. Nr. 18. S. 728.
- ERNST FREUND. — Über die Serodiagnose des Karzinoms. *Wiener Klin. Wochenschr.*, 26, 1913. Nr. 18, 730.
- FRITZ HEIMANN. — Zur Bewertung der Abderhaldenschen Schwangerschaftsreaktion. *Munchener med. Wochenschr.*, 1913. N. 17.
- N. MARCUS. — Untersuchungen über die Verwertbarkeit der Abderhaldenschen Fermentreaktion bei Schwangerschaft. und Karzinom. *Berliner Klin. Wochenschr.*, 1913. Nr. 17.
- JOHANNES FISCHER. — Gibt es spezifische, mit dem Abderhaldenschen Dialysierverfahren nachweisbare Schutzfermente im Blutserum Geisterkranker. *Sitzungsberichte u. Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft von Rostock.*, 5, 3 mai 1913.

- CESARE DECIO. — Untersuchungen über die Anwendung der Abderhaldenschen Reaktion auf dem Gebiete der Geburtshilfe. *Gynæk. Rundschau.*, 1913.
- CARCY PRATT AND MC CORD. — The employment of protective enzymes of the blood as a means extracorporeal diagnosis, Serodiagnosis of pregnancy. *Surg. Gynec. and Obstetr.*, 16, 1913. Nr. 4. P. 418.
- WILLIAMS AND PEARCE. — Abderhaldens Biological Test for pregnancy. *Surg. Gynec. and Obstetr.*, 16, 1913. Nr. 4. P. 411.
- HENRY SCHWARZ. — The practical application of Abderhaldens biological test of pregnancy. *The interstate med. journ.*, 20, 1913.
- RICHARD FREUND UND CARL BRAHM. — Die schwangerschaftsdiagnose mittels der optischen Methode und des Dialysierverfahrens. *Münchener med. Wochenschr.*, 1913. Nr. 13. S. 685.
- BRUNO STANGE — Zur biologischen Diagnose der schwangerschaft. *Müncher med. Wochenschr.*, 1913. Nr. 20. S. 1084.
- EIRICH FRANK UND FRITZ HEIMANN. — Über Erfahrungen mit der Abderhaldenschen Fermenteraktion beim kazinom. *Berliner Klin Wochenschr.*, 1913. Nr. 14.
- BEHNE — Ergibt das Dialysierverfahren von Abderhalden eine spezifische Schwangerschaftsreaktion? *Zentralbl. für Gynækologie*, 1913. Nr. 17.
- TH. PETRI. — Über das Auftreten von Fermenten im Tier- und Menschenkörper nach parenteraler Zufuhr von art- und individuum-eigenem Serum. *Münchener med. Wochenschr.*, 1913. S. 1137.
- C.-A. HEGNER. — Zur Anwendung des Dialysierverfahrens nach Abderhalden in der Augenheilkunde. *Münchener med. Wochenschr.*, 1913. S. 1138.
- W. RÜBSAMEN. — Zur biologischen Diagnose der Schwangerschaft mittels der optischen Methode und des Dialysierverfahrens. *Münchener med. Wochenschr.*, 1913. S. 1139.

- WEGENER. — Serodiagnostik nach Abderhalden in der Psychiatrie. *Münchener med. Wochenschr.*, 1913. S. 1197.
- ERWIN SCHIFF. — Ist das Dialysierverfahren Abderhaldens differentialdiagnostisch verwertbar? *Münchener med. Wochenschr.*, 1913. S. 1197.
- VICTOR L. KING. — Über trockenes Plazentapulver und seine Anwendung bei dem Abderhaldenschen Dialysierverfahren bezüglich der Diagnose der Schwangerschaft. *Münchener med. Wochenschr.*, 1913. S. 1198.
- W. JONAS. — Beiträge zur klinischen Verwertbarkeit der Abderhaldenschen Schwangerschaftsreaktion (Dialysierverfahren). *Deutsche med. Wochenschr.*, 1913. S. 1099.
- FRANZESCO MACCABRUNI. — Über die Verwendbarkeit der Abderhaldenschen Reaktion bei der serumdiagnose der Schwangerschaft. *Münchener med. Wochenschr.*, 1913. S. 1200.
- FAUSER. — Pathologisch-serologische Befunde bei Geisteskranken auf Grund der Abderhaldenschen Ausschauungen und Methodik Psychiatrisch. *Neurol. Wochenschr.*, 31 mai 1913.
- ARNO, ED. LAMPÉ UND PAPAZOLU. — Serologische Untersuchungen mit Hilfe des Abderhaldenschen Dialysierverfahrens bei Gesunden. *Münchener med. Wochenschr.*, 1913.
- BERNARD ASCHNER. — Untersuchungen über die Serumfermentreaktion nach Abderhalden. *Berliner Klin. Wochenschr.*, 1913.
- ARNO ED. LAMPÉ UND PAPAZOLU. — Serologische Untersuchungen mit Hilfe des Abderhaldenschen Dialysierverfahrens bei Gesunden und Kranken Studien über die Spezifität der Abwehrfermente. 2. Mitt. Untersuchungen bei Morbus Basedowi Nephritis und Diabetes melitus. *Münchener med. Wochenschr.*, 1913.
- GEBB. — Die Untersuchungsmethoden nach Abderhalden in der Augenheilkunde. Bericht über die 39. *Versammlung der ophthalmol. Gesellschaft zu Heidelberg*, 1913.

- VON HIPPEL. — Über sympathische Ophtalmie und juvenilen Katarakt (Das Abderhaldensche Dialysierverfahren bei diesen beiden Erkrankungen, sowie bei Keratitis parenchymatosa). *Bericht über die 39. Versammlung der Ophthalmol. Gesellsch. In Heidelberg.*
- LUDWIG PINCUSOHN. — Untersuchungen über die fermentativen Eigenschaften des Blutes. *Biochemische Zeitschrift.* 51.1913.107.
- K. JAWORSKI UND Z. SZYMANOWSKI. — Beitrag zur Serodiagnostik der Schwangerschaft. *Wiener Klin. Wochenschr.* Nr. 23.1913.
- LICHTENSTEIN. — Zur Serumreaktion nach Abderhalden. *Münchener med. Wochenschr.*, 1913.
- SIGMUND GOTTSCHALK : Zur Abderhaldenschen Schwangerschaftsreaktion. *Berlin. Klin. Wochenschr.*, 23 juin 1913. S. 1151.
- HERMANN LUDKE. — Diagnostic précoce du carcinome moyen au moyen du procédé de dialysation d'après E. Abderhalden. *Gazette des Hôpitaux*, 86^e année, Nr. 65, 10 juin 1913. P. 1064.
- EVLER. — Beiträge zu Abderhaldens Serodiagnostik. *medizin. Klinik.*, 29, juin 1913, Nr. 26 u. 27. S. 1043. Voir aussi¹ Emil Abderhalden, 1913. Nr. 29. S. 1171.
- ARTHUR² LEROY. — Essai sur le mécanisme probable de la crise dans l'épilepsie et dans l'asthme. *Paris médical*, 22 mai 1913. P. 70.
- ERPICUM. — *Bulletin de l'Académie Royale médicale de Belgique*, IV^e série, t. XXVIII, 28 juin 1913.
- H. MIESSNER. — Die Anwendung des Dialysierverfahrens nach Abderhalden zur Diagnose der Tröchtigkeit und von Infektionskrankheiten. *Deutsche tieræztl. Wochenschr.*, 1913. Nr. 26.
- DISKUSSION AVEC HEGNER. — « Über das Dialysierverfahren in der Augenheilkunde » von Binswanger u. Ahrens. *Münchener med. Wochenschr.*, 1913. Nr. 27. S. 1518.

- PARSAMOOR (O.). — Die biologische Diagnostik der Schwangerschaft nach Abderhalden. *Zentralblatt f. Gynækologie* 1913. Nr. 25.
- ARNO ED. LAMPÉ. — Basedow'sche Krankheit und Genitale Untersuchungen mit Hilfe des Abderhaldenschen Dialysierverfahrens. *Monatsschr. f. Geburtshilfe u. Gynækologie*, 38.1913. S. 45.
- VEIT (J.). — Die Serodiagnostik der Gravidität. *Berlin. Klin. Wochenschr.*, 1913. Nr. 27.
- PARI (G.-A.). — Sulla sierodiagnosi della gravidanza secondo l'Abderhalden. *Acc. Med. di Padova*, 28 févr. 1913.
- Sulla sierodiagnosi della gravidanza secondo l'Abderhalden. *Gazetta degli Ospedali e delle Cliniche*, 1913. Nr. 69. P. 727.
- ERNST HEILNER UND TH. PETRI. — Über künstlich herbeigeführte und natürlich vorkommende Bedingungen zur Erzeugung der Abderhaldenschen Reaktion und ihre Deutung. *Münchener med. Wochenschr.*, 1913, Nr. 28. S. 1530.
- IDZISLAW STEISING. — Über die Natur des bei der Abderhaldenschen Reaktion wirksamen Ferments. *Münchener Med. Wochenschr.*, 1913. Nr. 28. S. 1535.
- ERICH FRANK, FÉLIX ROSENTHAL UND HANS BIBERSTEIN. — Experimentelle Untersuchungen über die Spezifität der proteolytischen Abwehr. (Schutz.) Fermente (Abderhalden.) *Münchener med. Wochenschr.*, 1913. Nr. 29. S. 1594.
- LAMPÉ. — Gesellschaft für Geburtshilfe u. Gynækologie. Leipzig, 610. Sitzung, 1913. *Zentralbl. f. Gynæk.*, 1913. Nr. 30.
- KARL KOLB. — Gelingt es mittels der Abderhaldenschen Fermentreaktion, den Nachweis eines persistierenden oder hypoplastischen Thymus zu führen? *Münchener. Med. Wochenschr.*, 29. Juli, 1913. Nr. 30. S. 1642.
- G. VON GAMBAROFF. — Die Diagnose der bössartigen Neubildungen und der Schwangerschaft mittels der Abder-

- haldenschen Methode. *Müncher med. Wochenschr.*, 29. Juli 1913. Nr. 30. S. 1644.
- ERNST FRAENKEL UND FRIEDRICH GUMPERTZ. — Anwendung des Dialysierverfahrens (nach Abderhalden) bei der Tuberkulose. *Deutsche med. Wochenschr.*, 14 Aug., 1913. S. 1585.
- FRANZ BRUCK. — Über den diagnostischen Wert der Abderhaldenschen Serumreaktion (Fermentreaktion). *Münchener med. Wochenschr.*, 12 Aug., 1913. S. 1775.
- M. E. GOUDSMIT. — Zur Technik des Abderhaldenschen Dialysierverfahrens. *Münchener med. Wochenschr.*, 1913, S. 1775.
- HANS SCHLIMPERT UND ERNST ISSEL. — Die Abderhaldensche Reaktion mit Tierplazenta und mit Tierserum. *Münchener med. Wochenschr.*, 1913 S. 1759.
- JULIUS BAUER. — Über den Nachweis organabbauender Fermente im Serum mittels des Abderhaldenschen Dialysierverfahrens. *Wiener Klin. Wochenschr.*, 1913. Nr. 27.
- ALEX PAPAZOLU. — Sur la production des substances biurétiques dans les centres nerveux malades (épilepsie, démence précoce, paralysie générale) et dans le corps thyroïde (goitre), le thymus et l'ovaire des Basedowiens, par le sérum des individus atteints de ces mêmes maladies *C. r. de la soc. de Biol.*, 74, 3 janvier 1913. S. 302.
- G. MARINESCO ET M^{me} ALEX, PAPAZOLU. — Sur la spécificité des ferments présents dans le sang des Parkinsoniens. *C. r. de la soc. de Biol.*, 74, 29 mai 1913. S. 1419.
- HEINRICH NEUE. — Über die Anwendung des Abderhaldenschen Dialysierverfahrens in der Psychiatrie. *Monatschr. f. Psychiatrie u. Neurologie*, 34, 1913. S. 95.
- AHRENS. — Über Abderhaldenreaktion bei Nervenerkrankungen. *Münchener med. Wochenschr.*, 1913. S. 1857.
- MICHEL BOLAFFIO. — Contributo alla diagnosi di gravidanza col metodo ottico di Abderhalten. *Patologica*, 5, 1913, Nr. 111. S. 352.
- CHARLES-C.-W. INDD. — Th. serum diagnosis of pregnancy. *Bull. of the Americ. med assoc.*, 60. 1913. Nr. 25. S. 1947.

- FRITZ HEIMANN. — Die Abderhaldensche schwangerschaftsreaktion. *Berliner Klin. Wochenschr.*, 1913. S. 1.
- LURRIE (R.-G.) — Abderhaldensche Reaktion. *Russkji Wratsch.* 12. 1913. S. 697.
- DAUNAY ET ECALLE. — De l'examen du sérum de la femme enceinte et de la femme non enceinte, par la méthode de dialyse d'E. Abderhalden. *C. r. hebd. des séances de la Soc. de Biol.*, 74. 1913. S. 1190.
- BAR. — A propos de la réaction d'Abderhalden. *Société d'obstétrique et de gynécologie de Paris*, juillet 1913.
- POLANO. — Zur biologischen schwangerschaftsdiagnose. *Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynæk.*, 37. 1913. S. 857.
- PETRI. — Über die Spezifität der gegen Plazenta gerichteten Schutzfermente des Schwangerenserums. *Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynæk.*, 37, 1913, S. 859.
- JOHANNA LEVY. — Zum Nachweis der Schwangerschaft durch das Dialysierverfahren nach Abderhalden. *Der Frauenarzt*, 28, 15, Juli, 1913. Heft. 7.
- URSTEIN (M.). — Die Bedeutung der Abderhaldenschen Dialysierverfahrens für die Psychiatrie und das korrelative Verhältnis von Geschlechtsdrüsen zu anderen organem mit innerer Sekretion. *Wiener Klin. Wochenschr.* 26, 1913, Nr. 53, S. 1325.
- MAYER (A.). — Über das Abderhaldensche Dialysierverfahren und seine Klinische Bedeutung. *Münchener med. Wochenschr.*, 1913, S. 1972.
- Über die Klinische Bedeutung der Abderhaldenschen Dialysierverfahrens. *Zbl. f. Gynæk.*, 1913, Nr. 32.
- G. PLOTKIN. — Zur Frage von der Organspezifität der Schwangerschaftsfermente gegenüber Plazenta. *Münchener med. Wochenschr.*, 1913. S. 1942.
- C.-F. JELLINGHAUS UND J.-K. LOSEE. — The sero-diagnosis of pregnancy by the dialysation method. Based on the examination of serum from five hundred and sixty-three different individual. *Bull. of the lying in hosp. of the city of New-York*, 9, 1913. S. 68.

- M.-J. BREITMANN. — Über die Diagnose der Leberkrankheiten mit Hilfe der Methode von Prof. Abderhalden, mit spezieller Berücksichtigung der Selbständigkeit der beiden Leberlappen. *Zbl. f. innere Medizin.*, 34, 1913, n° 34.
- B.-TH. KABANOW. — Beziehungen der Magen-Darmaffektionen zu der perniziösen Anämie nach dem Dialysierverfahren von Prof. E. Abderhalden. *Zbl. f. innere Medizin.*, 34, 1913, n° 34.
- N. KAFKA. — Über den Nachweis von Abwehrfermenten im Blutserum vornehmlich Geisteskranker durch das Dialysierverfahren nach Abderhalden. 1 mitt. *Zeitschr. f. d. gesamte Neurologie und Psychiatrie*, 18, 1913. S. 341.
- F. DEUTSCH UND R. KOEHLER. — Serologische Untersuchungen mittels der Dialysierverfahrens nach Abderhalden. *Wiener Klin. Wochenschr.* 1913, n° 34.
- A. FAUSER. — Die Serologie in der Psychiatrie. *Münchener med. Wochenschr.*, n° 36, S. 1984.
- JACOB GUTMANN UND SAMUEL J. DRUSKIN. — Experiences with the Abderhalden test in the diagnosis of pregnancy. *Medical Record*, 84, S. 99, juillet, 1913.
- A. FAUSER. — Pathologisch serologische Befunde bei Geisteskranken auf Grund der Abderhaldenschen Anschauungen und methodik. *Allgem. Zeitscha. f. Psychiatrie Medizin*, 70, 1913. S, 719.
- WILHELM MAYER. — Die Bedeutung der Abderhaldenschen Serodiagnostik für die Psychiatrie. *Münchner med. Wochenschr.*, 1913. Nr. 37. S. 2044.
- P. JOEDICKE. — Zum Nachweis von organab bauenden Fermenten im Blute von Mongolen, *Wiener Klin. Rundschau*. 1913. Nr. 38.
- CARLO FERRARI. — Sulla specificità dei peptoni placentari nella diagnosi della gravidanza col método polarimetrico. *Patol.* 5. 1913. S. 449.
- ARNO E. LAMPÉ. — Untersuchungen mit Hilfe des Abderhaldenschen Dialysierverfahrens bei Langentuberkulose. *Deutsche med. Wochenschr.* 1913. Nr. 37.

- J.-B. PORCHOWNICK. — Die Serodiagnostik der Schwangerschaft. *Zbl. f. Gynæk.* 37. 1913. S. 1226.
- ERNST FRÄNKEL. — Über Spezifität und Wesen der Abderhaldenschen Abwehrfermente. *Wiener Klin Rundschau*, 1913. Nr. 38.
- C.-F. BALL. — A new Sero-Diagnostic Test for Pregnancy (Abderhalden's). Vermont. *Medical Monthly*. August. 1913.
- FRITZ HEIMANN. — Die Abderhaldensche Schwangerschaftsreaktion. *Berliner Klinik*. Heft, 301. Jahrg. 25. Juli 1913.
- ARNO ED. LAMPÉ UND ROBERT FUCHS. — Serologische Untersuchungen mit Hilfe der Abderhaldenschen Dialysierverfahrens bei Gesunden und Kranken. Studien über die Spezifität der Abwehrfermente, 3 Mitt. Weitere Untersuchungen bei Schilddrüsenerkrankungen; Morbus Basedowii, Basedowoid, Myxödem, endemische Struma. *Münchener med. Wochenschr.*, 1913. Nr 38 und 39. S. 2112, und 2117.
- B. TH. KABANOW. — Über die Diagnose der Magendarmaffektion mit Hilfe des Abderhaldenschen Dialysierverfahrens. *Münchener med. Wochenschr.*, 1913. S. 2164.
- H. DEUTSCH. — Erfahrungen mit dem Abderhaldenschen Dialysierverfahrens *Wiener Klin. Wochenschr.*, 1913. Nr 38.
- ADOLF FUCHS. — Tierexperimentelle Untersuchungen über die Organspezifität der proteolytischen Abwehrfermente (Abderhalden). *Münchener med. Wochenschr.*, 1913. Nr 40. S. 2230.
- P. SCHAEFER. — Der Abderhaldensche Fermentnachweis im Serum von Schwangeren. *Berliner Klin. Wochenschr.*, 1913. Nr. 35.
- TSCHUDNOWSKY. — Zur Frage über den Nachweis der Abwehrfermente mittels der optischen Methode und des Dialysierverfahrens nach Abderhalden im Blutserum bei Schwangerschaft und gynäkologischen Erkrankungen. *Münchener med. Wochenschr.*, 1913. Nr. 41. S. 2282.

- M. RUBINSTEIN UND A. JULIEN. — Examen des sérums des chevaux atteints d'ascaridiose par la méthode d'Abderhalden. *C. r. des séances de la Soc. de biol.*, 75, 26 juillet 1913. S. 180.
- SCHATTKÉ. — Die Anwendung des Abderhaldenschen Dialysierverfahrens zur Diagnose der Trächtigkeit bei Tieren. *Zeischrift f. Veterinærkunde mit besonderer Berücksichtigung der Hygiene*, 25, 1913. S. 425.
- C. JUDD. — The technic of Abderhalden's pregnancy reaction. *The Am. J. of the med. sc.*, septembre 1913, page 391.
- M. ZALLA. — I metodi sierodiagnostici di Abderhalden. *Rivista di Patol. nervose e mentale*, 18, 1913. Fasc. 9.
- F. EBELER UND R. LOENNEBERG. — Zur serologischen schwangerschaftsreaktion nach Abderhalden. *Berliner Klin. Wochenschr.*, 1913. Nr. 41.
- OTTO BINSWANGER. — Die Abderhaldensche Seroreaktion bei Epileptikern. *Münchener med. Wochenschr.*, 60, 1913. Nr. 42.
- E.-V. HIPPEL. — Zur Ätiologie des Keratokonus (Untersuchungen mit dem Abderhaldenschen Dialysierverfahrens) *Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde*, 51, 1913. S. 273.
- ANTON SUNDE. — Die Abderhaldensche serologische Reaktion der Schwangerschaft. *Norsk Magaz. for Laegewidenchaaben*, 74, 1913. S. 1234.
- PAOLOS AR. PETRIDIS. — Ferments protecteurs de l'organisme animal. Diagnostic biochimique de la grossesse par la réaction d'Abderhalden. Procédé du dialyseur. *Progrès méd.*, 44, 1913. S. 451.
- JACOB GUTMAN ET SAMUEL O. DRUSKIN. — Experiences with the Abderhalden test in the diagnosis of pregnancy. *Medical record*, 84, 1913. S. 99.
- HUSSELS. — Über die Anwendung des Abderhaldenschen Dialysierverfahrens in der Psychiatrie. *Psychiatrie neurologische Wocheuschrift*, 15, 1913. Nr. S. 329.

- JAMISON CHAILLÉ AND J.-C. COLE. — The sero-diagnosis of pregnancy, *New Orléans med. and surg. J.* 66, 1913, S. 188.
- F. JESSEN. — Über untersuchungen mit dem Abderhaldenschen Dialysierverfahrens bei Tuberkulösen, *Medizin. Klinik.* 9, 1913. S. 1760.
- NAUMANN. — Experimentelle Beiträge zum Schwangerchaftsnachweis mittels des Dialysierverfahrens nach Abderhalden, *Deutsche medizin. Wochenschr.*, 39, 1913. S. 2086.
- KASIMIR JAWORSKI. — Klinische Bemerkungen betreffend die Abderhaldensche Reaktion, *Deutsche med. Wochenschr.*, 1913. S. 582.
- RUDOLF BUNDSCHUH ET HANS RÖMER. — Über das Abderhaldensche Dialysierverfahrens in der Psychiatrie, *Deutsche med. Wochenschr.*, 1913. N. 42.
- EDMUND WALDSTEIN UND RUDOLF EKLER. — Der Nachweis resorbierten Spermas im weiblichen organismus, *Wiener Klin. Wochenschr.*, 26, 1913. Nr. 42.
- A. LEROY. — De la pathogénie du psoriasis, *Paris-Médical*, 11 octobre 1913.
- KOBANOFF. — Der Abderhaldenschen Reaktion als diagnostisches Hilfsmittel bei Erkrankungen innerer organe, *Aerztliche Vereine in Moskau*, octobre 1913.
- R. LABUSQUIÈRE. — Le diagnostic physiologique de la grossesse d'après la méthode d'Abderhalden, *Annales de gynécologie et d'obstétrique*, novembre 1913.
- FIESSINGER. — *Bulletin médical*, 12 novembre 1913.
- LEGER BROCKMANN. — The diagnostic value of Abderhalden's method in carcinoma, *The Lancet*, 15 novembre 1913.
- ECALLE. — *Société d'Obstétrique de Paris*, 18 novembre 1913.
- P. HUSSY. — Wert der Abderhaldenschen Swaugerschnaftdiagnose, *Mediz. gesellschaft. Basel*, 6, V. 20, XI, 1913.
- A. SCHERER. — *Berliner*, 14 nov. 1913.
- THÉOBALD. — *Berlin. med. Woch.*, 24 novembre 1913.
- R. HERTZ ET H. BROCKMANN. — Über das Workommen der das Lebergewebe spoltenden Fermente bei Leberkranken, *Wiener med. Woch.*, 4 décembre 1913.

- B. SABIN. — De la réaction d'Abderhalden dans le diagnostic de la grossesse. *Presse Médicale*, 13 décembre 1913.
- A. LÉRY. — La réaction d'Abderhalden chez les épileptiques. *Soc. de Biol.*, 26 décembre 1913.
- R. S. KRIM (Petersburg). — Serodiagnostik nach Abderhalden bei Tuberkulose. *Russk. Wratsch*, n° 43, 1913.
- C. FRIED (München). — Serodiagnostik der malignen geschwülste. *Munch. med. Woch.*, n° 50, 1913.
- A.-E. LAMPÉ. — Technik der Bereitung der organe das Abderhaldensche Dialysierverfahren. *Munch. med. Woch.*, n° 51, 1913,
- HANS OELLER UND R. STEPHAN. — Technische neuerungen zur Dialysier methode. *Deutsch. med. Woch.*, n° 52, 1913.
- W. MAYER. — Spezifität der Abderhaldenschen Abwehrfermente. *Munch. med. Woch.*, n° 52, 1913.
- HANS GUGGENHEIMER. — Über Enzymwirkung fördernde « auxo-autolytische » Stoffe im Blutserum von Kranken und Schwangeren. *Deuts. med. Woch.*, 8 janvier 1914.
- MAYER. — Über das Abderhaldensche Dialysierverfahren. *Munch. med. Woch.*, n° 2, 13 janvier 1914.
- E. WEGENER. — Weitere Untersuchungsergebnisse mittels des Abderhaldenschen Dialysierverfharens. *Munch. med. Woch.*, n° 1, 6 janvier 1914.
- H. OELLER UND R. STEPHAN. — Klinische Studien mit dem Dialysierverfahren nach Abderhalden. *Munch. med. Woch.*, n° 1, 6 janvier 1914.
- EUGEN WEISS. — Beitrag zur Karzinomfrage. *Deutsch. med. Woch.*, 8 janvier 1914.
- La réaction d'Abderhalden et le diagnostic de la grossesse (Discussion de L. Lorier, Bar, Delbet). *Société d'obstétrique et de Gynécologie de Paris*. Séance du 12 janvier 1914.
- OBREGIA ET PITULESCO. — La séro-réaction d'Abderhalden dans la démence précoce. *Société de Biologie*. Bucarest, 10 janvier 1914.
- N. KOTCHNEFF ET A. CHINGREWA. — Sur la signification de la

- méthode d'Abderhalden. *Réunion de Biologie*. Saint-Pétersbourg, 24 janvier 1914.
- A. PHILIBERT. — Les ferments de défense d'Abderhalden envisagés au point de vue du diagnostic. *Progrès médical* 31 janvier 1914.
- ERNST FRANKEL. — Über die Verwendung der Abderhalden'schen reaktion bei carcinom und tuberculose. *Berl. Klin. Woch.*, février 1914.
- PLAUT. — Über Adsorptionerscheinungen bei dem Abderhaldenschen Dialysierverfahren. *Munch. med. Woch.*, n° 85, 3 février 1914.
- ALLMANN. — Zur serodiagnostik nach Abderhalden. *Deutsch. med. Woch.*, n° 6, 5 février 1914.
- PAUL HIRSCH. — Tierexperimentell Untersuchungen zur Frage der Spezifität der Abwerfermente. *Deutsch. med. Woch.*, n° 6, 5 janvier 1914.
- OTTO LOWY. — A serum reaction as an aid in the diagnosis of cancer. *Journ. of the American med. Association*, 7 février 1914.
- BABES ET PITULESCO. — La séro-réaction d'Abderhalden et le traitement anti-rabique. *Société de Biologie*. Bucarest, 7 février 1914.
- OBRÉGIA ET PITULESCO. — La séro-réaction d'Abderhalden dans la paralysie générale, l'épilepsie, les psychoses périodiques. *Société de Biologie*. Bucarest, 7 février 1914.
- LOUIS-M. WARFIELD. — Presence of dialysable Products reacting to Abderhalden's Ninhydrin in the urine of Pregnant women. *Journ. of the American med. Association*, 7 février 1914.
- PIORKOWSKI. — Zur Sicherung der carcinom diagnose Berlin. *Klin. Woch.*, 9 février 1914.
- A. FUSCHSUND A. FREUND. — Über den Nachweis protéolytischer Abwehrfermente im Serum geisteskranker durch das Abderhaldensche Dialysierverfahren. *Munch. Med. Woch.*, n° 6, 10 février 1914.
- L. MICHAELIS UND L. LAGERMARCK. — Die Abderhaldensche

- Swangerschaftsdiagnose. *Deutsche med. Woch.*, n° 7, 12 février 1914.
- MAX KASTAN. — Psychosen, Abbau-und Ferment-spaltungsvorgänge. *Deutsch. med. Woch.*, n° 7, 12 février 1914.
- J.-W. BALLANTINE. — The nature of Pregnancy. *British. med. Journal*, 14 février 1914.
- H. de WAELE. — Zur Technik des Abderhaldenschen Dialysierverfahrens. *Munch. med. Woch.*, n° 7, 17 février 1914.
- CLARENCE. — Abderhalden Serodiagnosis of cancer. *The journal of the americ. med. association*, 21 février 1914.
- ERNST VOELKEL. — Zur serodiagnostik von Infections krankheiten mit Hilfe des Abderhaldenschen Dialysierverfahrens. *Munch. med. Woch.*, n° 7, 17 février 1914.
- HUGO SINGER. — Über die Spezifität des Abderhaldenschen Dialysierverfahrens. *Munch. med. Woch.*, n° 7, 17 février 1914.
- JEAN BENECH. — Essai de la séro-réaction d'Abderhalden dans le cancer. Réunion biologique (Nancy) 17 février 1914.
- FUSCHS ET FREUND. — Présence de ferments protéolytiques protecteurs dans le sérum des aliénés par le procédé de dialyse d'Abderhalden. *Munch. med. Woch.*, 19 février 1914.
- S. DEJUST. — Technique de la réaction d'Abderhalden. *Progrès Médical*, 21 février 1914.
- UBRICH FRIEDEMANN UND ALEXANDRA SCHOENFELD. Zur theorie der Abderhalden'schen Reaktion. *Berlin Klin. Woch.*, 23 février 1914.
- H. OELLER ET R. STEPHANS. — Notizen über die Verwertbarkeit des dialysierverf beliens Kahrinischen und serologischen Fragestellungen. *Munch. med. Woch.*, n° 8, 24 février 1914.
- H. KEMMERER, M. CLAUSZ, K. DIETERICH. — Über das Abderhaldensche Dialysierverfahren. *Munch. med. Woch.* n° 9, 3 mars 1914.

- FLATOW. — Ueber die Abderhaldensche Swangerschaftsdiagnose. *Munch. med. Woch.*, n° 9, 3 mars 1914.
- II. DEETJEN UND E. FRENKEL. — Untersuchung über die Ninhydrinréaktion des Glukosamins und über die Fehlerquellen bei der Ausführung von Abderhaldens draly-siervverfahren. *Munch. med. Woch.*, n° 9, 3 mars 1914.
- A. E. LAMPÉ. — Serologische Untersuchungen mit Hilfe des Abderhaldenschen Dialysiervfahrens bei gesunden und Kranken. Studien über die Spezificitæt der Abwehrfermente. *Munch. med. Woch.*, n° 9, 5 mars 1914.
- BEARD. — The serum reaction of prenancy and of the cancer. *British. med. Journard*, 7 mars 1914.
- JAMES YOUNG. — The nature of pregnancy. *British. med. Journ.*, 14 mars 1914.
- B. SABIN. — *Biologica*, mars 1914.
- S. DEJUST. — *Société de Biol.*, 21 mars 1914.
- AB. LABBÉ ET P. PÉTRIDIS. — Le diagnostic biologique de la grossesse. *Journ. de méd. de Paris*, 4 avril 1914.

INDEX ALPHABÉTIQUE

Les numéros placés à la suite des noms indiquent les pages de la Bibliographie où se trouvent les références des auteurs cités.

- E. Abderhalden, p. 133-134-138-139-146-147-148.
E. Abderhalden et P. Andryesky, p. 147.
E. Abderhalden et C. Brahm, p. 136-141.
E. Abderhalden, G. Caemmerer, et L. Pincussohn, p. 136-139.
E. Abderhalden et Dammhahn, p. 137.
E. Abderhalden et H. Deetjen, p. 138.
E. Abderhalden et Fodor, p. 147-148.
E. Abderhalden et H. Geddert, p. 138.
E. Abderhalden et A. Gigon, p. 136.
E. Abderhalden et R. Heise, p. 137.
E. Abderhalden et A. Hunter, p. 137.
E. Abderhalden et Immisch, p. 140.
E. Abderhalden et A. Israël, p. 140.
E. Abderhalden et E. Kämpf, p. 141.
E. Abderhalden et G. Kapfberger, p. 141.
E. Abderhalden et F. Kashiwado, p. 141.
E. Abderhalden et M. Kiutsi, p. 142.
E. Abderhalden et A. H. Kœlker, p. 135.
E. Abderhalden, A. Kœlker et F. Medigreceanu, p. 139.
E. Abderhalden et A. Lampé, p. 142-147.
E. Abderhalden et Lester, p. 138.
E. Abderhalden et F. Lussana, p. 137.
E. Abderhalden et W. Manwaring, p. 138.
E. Abderhalden et L. Michaelis, p. 136.
E. Abderhalden et B. Oppler, p. 138.
E. Abderhalden et L. Pincussohn, p. 139-140-141-142.
E. Abderhalden et H. Pringsheim, p. 135-137.
E. Abderhalden et E. Rathsmann, p. 140.
E. Abderhalden et A. Rilliet, p. 137.
E. Abderhalden et P. Rona, p. 134-136-138-139-142.

- E. Abderhalden et E. Schiff,
p. 147-148.
- E. Abderhalden et B. Schilling,
p. 140.
- E. Abderhalden et A. Schittenhelm, p. 135-136.
- E. Abderhalden et J. Schmid,
p. 141.
- E. Abderhalden et H. Schmid,
p. 147.
- E. Abderhalden et J.-G. Slewsky, p. 140.
- E. Abderhalden et E. Steinbeck, p. 137.
- E. Abderhalden et W. Weichart, p. 141.
- E. Abderhalden et A. Weil,
p. 141-147.
- E. Abderhalden et Yutaka Terunchi, p. 134-136-137.
- Ahrens, p. 156.
- Allmann, p. 162.
- B. Aschner, p. 152.
- Babes et Pitulesco, p. 162.
- C. Ball, p. 158.
- J.-W. Ballantine, p. 163.
- Bar, p. 156.
- J. Bauer, p. 150-155.
- Béard, p. 164.
- Behne, p. 151.
- J. Benech, p. 163.
- O. Binswanger, p. 159.
- B. Bloch et R. Massini, p. 145.
- M. Bolaffio, p. 156.
- J. Breitmann, p. 157.
- L. Brockmann, p. 161.
- F. Bruck, p. 155.
- R. Bundschuch et H. Römer,
p. 160.
- G. von Bunge, p. 145.
- J. Chaillé et J. Cole, p. 160.
- Clarence, p. 163.
- W. Cramer, p. 145.
- Daunay et Ecalle, p. 156.
- C. Decio, p. 150-151.
- H. Deetjen et E. Fraenkel,
p. 164.
- S. Dejust, p. 163-164.
- H. Deutsch, p. 158.
- Deutsch et R. Köhler, p. 157.
- F. Ebeler et R. Lönnberg,
p. 159.
- Ecalle, p. 161.
- R. Ekler, p. 150.
- E. Engelhorn, p. 149.
- E. Epstein, p. 150.
- Epicum, p. 153.
- P. Esch, p. 145.
- Evler, p. 153.
- H. Falk, p. 149.
- A. Fauser, p. 149-150-152-157.
- C. Ferrari, p. 150-158.
- Fieux et Dantin, p. 149.
- E. Fischer, p. 145.
- J. Fischer, p. 151.
- Flatow, p. 164.
- E. Frank et F. Heimann,
p. 149-151.
- E. Frank, F. Rosenthal, H. Silberstein, p. 154.
- E. Fränkel, p. 158.
- R. Franz, p. 145.
- R. Franz et Jarish, p. 149.
- E. Freund, p. 150.
- R. Freund et C. Brahm, p. 151.
- E. Friedberger, p. 142.
- U. Friedemann et Isaac, p. 145.
- U. Friedemann et A. Schönfeld, p. 163.
- Fiessinger, p. 161.
- E. Fischer et E. Abderhalden,
p. 135.
- E. Fraenkel, p. 162.
- E. Fraenkel et F. Gumpertz,
p. 155.
- C. Fried, p. 161.
- A. Fuschs, p. 158.
- A. Fuschs et A. Freund, p. 163.
- P. Gaifami, p. 150.
- Gambaroff, p. 155.
- Gebb, p. 153.
- S. Gottschalk, p. 153.
- M. Goudsmith, p. 155.
- H. Guggenheimer, p. 161.
- G. Gruber, p. 145.
- J. Gutmann et J. Druskin,
p. 157-160.
- A. Hegner, p. 152-154.

- E. Heilner, p. 143.
 E. Heilner et Th. Pétri, p. 154.
 F. Heilmann, p. 149-150-156-158.
 M. Henkel, p. 149.
 Hertle et Pfeiffer, p. 143.
 R. Hertz et H. Brockmann, p. 161.
 T. Heynemann, p. 144.
 E. Hippel, p. 153-159.
 P. Hirsch, p. 162.
 Hussels, p. 160.
 P. Hussey, p. 161.
 C. Indd, p. 156.
 K. Jaworski, p. 160.
 Jaworsky et Szymanowski, p. 153.
 C. Jellinghaus et J. Losee, p. 157.
 F. Jessen, p. 160.
 P. Jodike, p. 158.
 W. Jonas, p. 152.
 B. Kabanow, p. 157-158-160.
 H. Kœmmerer, M. Clausz, K. Dieterich, p. 164.
 N. Kafka, p. 157.
 G. Kapsenberg, p. 144.
 M. Kastan, p. 163.
 V. King, p. 152.
 K. Kolb, p. 155.
 Kornel von Körösy, p. 144.
 N. Kotchneff et A. Chingrewa, p. 162.
 R. S. Krim, p. 161.
 A. Labbé et Pétridis, p. 164.
 R. Labusquière, p. 160.
 Lampé, p. 154-158-161-164.
 A. Lampé et R. Fuschs, p. 158.
 A. Lampé et Papazolu, p. 152-153.
 O. Lederer, p. 150.
 Le Lorier, p. 149.
 Leri, p. 161.
 A. Leroy, p. 153-160.
 J. Lévy, p. 156.
 Lichtenstein, p. 153.
 P. Linding, p. 149.
 Lommel, p. 144.
 O. Lowy, p. 162.
 H. Ludke, p. 153.
 R. Lurrie, p. 156.
 F. Maccabruni, p. 152.
 G. Marinresco et Mme Papazolu, p. 155.
 V. Markus, p. 151.
 W. Mayer, p. 156-157-161.
 L. Michaelis et L. Lagermarck, p. 163.
 L. Michaelis et P. Rona, p. 144.
 H. Miessner, p. 154.
 E. Moro, p. 143.
 Naumann, p. 160.
 H. Neue, p. 155.
 Obrégia et Pitulesco, p. 162.
 Hans Oeller et R. Stéphan, p. 161-164.
 C. Oppenheimer, p. 144.
 Paltauf, p. 150.
 A. Papazolu, p. 155.
 G. Pari, p. 154.
 Parsamoor, p. 154.
 Th. Pétri, p. 151-156.
 P.-A. Pétridis, p. 160-164.
 H. Pfeiffer, p. 143.
 H. Pfeiffer et A. Jarrish, p. 144.
 H. Pfeiffer et S. Mita, p. 144.
 A. Philibert, p. 162.
 G. Pighini, p. 144.
 L. Pincussohn, p. 153.
 Piorkosvski, p. 163.
 C. von Pirquet, p. 105-143.
 Plaut, p. 162.
 G. Potkin, p. 157.
 Polano, p. 156.
 J. Porchownick, p. 158.
 C. Pratt et Cord, p. 151.
 Reines, p. 150.
 Ch. Richet, p. 142.
 R. Rössle, p. 143.
 M. Rubinstein et A. Julien, p. 159.
 W. Rubsamen, p. 152.
 B. Sabin, p. 161-164.
 G. Salus, p. 144.
 P. Schæfer, p. 159.
 Schattke, p. 159.
 E. Schiff, p. 152.

- | | |
|--|-------------------------------------|
| A. Schittenhelm, p. 143. | J. Veit, p. 149-154. |
| H. Schlecht, p. 144. | E. Voelkel, p. 163. |
| H. Schlimpert et J. Hendry,
p. 150. | H. de Waele, p. 163. |
| H. Schlimpert et E. Issel,
p. 155. | E. Waldstein et R. Ekler
p. 160. |
| H. Singer, p. 163. | L.-M. Warfield, p. 162. |
| H. Schwartz, p. 149. | Wegener, p. 152-161. |
| B. Stange, p. 149-151. | W. Weichart, p. 143-145. |
| Z. Steising, p. 154. | E. Weiss, p. 162. |
| A. Sunde, p. 159. | Williams et Pearce, p. 151. |
| Théobald, p. 161. | Wimvorter, 43. |
| Tschudnowsky, p. 159. | J. Young, p. 164. |
| M. Urstein, p. 156. | M. Zalla, p. 159. |
| | E. Zunz, p. 143. |

TABLE DES MATIÈRES

	Pages
Introduction	4
Principe de la réaction	9
Technique et résultats cliniques.	
Préparation du matériel	18
Épreuve de la perméabilité des dialyseurs aux pro- duits de décomposition de l'albumine	21
Préparation du substratum	24
Obtention du sérum.	28
Conduite d'une recherche.	29
Causes d'erreur	33
Modifications de la réaction	36
Application au diagnostic de la grossesse	38
Recherche de la réaction dans le sérum de femmes non enceintes	45
Grossesse extra-utérine.	47
Influence de divers états pathologiques	51
La réaction dans les cas d'éclampsie	56
Époque de l'apparition et de la disparition des fer- ments de défense	58
Recherche de la réaction dans la grossesse avec d'au- tres matériaux que le sérum et le placenta.	59
Existe-t-il une lactase dans le sang des femmes en- ceintes.	60

Application au diagnostic du cancer	62
— des maladies nerveuses	72
— de la tuberculose.	102
Application au diagnostic des dermatoses, des lésions rénales, des lésions hépatiques, des lésions de l'appareil digestif et de la scarlatine.	106
La séro-réaction dans le diabète et les néphrites	109
— les maladies du foie	112
— les maladies de l'estomac	114
— la scarlatine.	115
La séro-réaction d'Abderhalden dans la série ani- male. Expériences personnelles.	117
Conclusion	130
Bibliographie	133-164
Index alphabétique	
Bibliographie	

MAYENNE, IMPRIMERIE CHARLES COLIN

111